



微信搜一搜



金英杰口腔学院

2 0 2 1 年 执 业 医 师 考 试

**绝密押题卷**



**2021 年**

**医师资格考试专用**



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



1. 以下不属于系统病史的是

A. 与修复相关的系统疾病史

B. 正在接受的全身性系统疾病治疗

C. 系统疾病对口腔疾病的影响

D. 药物对口腔疾病的影响

E. 疾病发生时间

答案：E

解析：

2. 以下不属于主诉的是

A. 疼痛

B. 肿胀

C. 出血

D. 功能障碍

E. 发病时间

答案：E

解析：

3. 关于家族史错误的是

A. 对于某些与遗传因素有关的口腔疾病，应

仔细询问

B. 尚需对患者家庭成员有关类似疾病作相

应调查

C. 能为诊断和治疗提供必要参考

D. 是病史中的重要部分

E. 与诊断无关

答案：E

解析：

4. 颞下颌关节检查不包括

A. 下颌运动

B. 髁突

C. 淋巴结

D. 开口型

E. 外耳道

答案：C

解析：该题为基础理论记忆题。颞下颌关节

检查是重要的口腔外部检查之一。它包括活

动度检查、关节弹响检查、外耳道前壁检查、

开口度及开口型检查、下颌侧船检查。

5. 无牙颌口腔专项检查不包技

A. 牙槽嵴



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.口腔黏膜

C.咬合关系

D.舌体

E.唾液

答案：C

解析：

6.残根缺损达龈下时，正确的处理方法是

A.一律拔除

B.消炎后，直接在根上修复

C.残根根管治疗后，直接在根上修复

D.不处理

E.可考虑残根根管治疗后，使用正畸牵引至

合适的位置后修复

答案：E

解析：

7.在同样咬合力情况下，患牙隐裂概率最高

的牙是

A.有楔状缺损的 4|

B.有银汞 MOD 充填的 7|

C.松动Ⅱ度的 6|

D.冷测反应阳性的 6|

E.有 3/4 金属冠的 5|

答案：B

解析：牙隐裂综合征是一种雅创伤，下颌牙

患牙隐裂综合征的概率最高，因为其牙冠高

度低并且向舌侧倾斜，导致非垂直咬合受力。

银汞 MOD 充填导致的牙体的缺损大大增

大了牙裂开的可能。而 3/4 冠修复包住了牙

尖所以隐裂的可能很小。

8.邻切嵌体牙体预备

A.切缘台阶长度不超过其 1/2

B.针道不可做在龈壁上

C.针道与唇面切 1/3 平行

D.邻面舌壁做洞斜面

E.制备倒凹以增加固位力

答案：C

解析：

9.下列措施不增加人造冠摩擦力的是

A.备牙时增大聚合角度

B.接触面适当粗糙



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.人造冠与患牙紧密结合

D.尽量使冠的各轴壁平行

E.增加牙体长度

答案：A

解析：备牙时增大聚合角度，虽然有利于冠的就位，但是脱位力的方向与轴壁间形成的角度减小，摩擦力也随之减小。

10.以下关于邻(牙合)嵌体邻面片切洞形的描述错误的是

A.用于邻面缺损大而浅时

B.可在片切面内制备箱型固位

C.可在片切面内制备小肩台

D.片切面颊舌边缘应达到自洁区

E.用于邻面突度较大时

答案：E

解析：片切洞形，用于邻面缺损范围大而浅，或邻面突度小，邻接不良的患牙，在片切面的中心，可根据患牙邻面缺损状况及嵌体的固位需要制作箱状洞形、沟固位形等增加固位效果。

11.关于高嵌体牙体预备，说法道里的是

A.功能尖磨除 1.5mm

B.非功能尖磨除约 1.0mm

C.轴壁下肩台约 1.0mm

D.洞缘斜面 0.5-0.7mm

E.牙体制备倒凹增加固位力

答案：E

解析：无倒凹嵌体所覆盖的范围内无倒凹存在，各轴面与针道彼此平行，以便顺利取戴。

12.为了增加全冠的固位力，下列方法错误的是

A.修复体与预备体的接触面要密合

B.增大修复体与预备体的接触面积

C.窝洞的点线角清楚

D.备牙时需特别注意增加牙面的粗糙度

E.设计针道辅助固位

答案：D

解析：

13.以下修复体边缘类型中强度量差的是

A.刃状



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.90°肩台

C.90°肩台+斜面

D.凹面

E.135°肩台

答案：A

解析：刃状、90。肩台、90。肩台+斜面、凹面、135。肩台是冠类修复体常用的龈边缘类型。其中选择刃状边缘的修复体的边缘呈刃状，容易弯曲变形，强度最差。

14.金瓷冠不透明瓷的厚度一般为

A.0.1mm

B.0.2mm

C.0.3mm

D.0.4mm

E.0.5mm

答案：B

解析 金瓷冠不透明瓷厚度以 0.2mm 为宜，不得超过 0.3mm。

15.为增强金瓷结合，其方法有很多，除外

A.喷砂

B.预氧化

C.超声清洗

D.电解蚀刻

E.除气

答案：E

解析：

16.如果根桩过长，易引起

A.断桩

B.根折

C.拆桩困难

D.只要根尖愈合，无明显影响

E.根尖周炎

答案：E

解析：

17.下列属于高嵌体适应证的是

A.能用充填法修复的牙体缺损

B.剩余牙体能提供足够的支持固位

C.剩余牙体能耐受功能状态下的(牙合)力

D.(牙合)面洞形较大，有牙尖需恢复

E.剩余牙体组织能提供足够的抗力形



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



答案：D

解析：高嵌体一般适用于以下情况：后牙的多

面嵌体；(牙合)面洞型较大时；(牙合)面有

较大范围缺损，但牙尖须恢复且有完整的颊

舌壁可保留时。

18.上颌磨牙桩冠修复时最可能利用的根管

是

A.近中颊根管

B.近中舌根管

C.腭根管

D.远颊根管

E.MB<sub>2</sub>

答案：C

解析：

19.粘接桥的固位是依靠

A.摩擦力

B.酸蚀，粘接技术

C.卡环

D.吸附力

E.粘接和卡环

答案：B

解析：

20.采用固定桥修复时，以下基牙数目确定

的影响因素，不正确的是

A.邻牙牙根情况

B.邻牙牙槽骨情况

C.邻牙牙周膜情况

D.咬合情况

E.修复体的材质

答案：E

解析：

21.以下不是王固定桥适应证的是

A.单颗前牙缺失

B.咬合关系正常

C.基牙牙周组织健康

D.前牙缺失伴大量骨缺损

E.对颌牙正常

答案：D

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



22. 衡量一个牙是否为固定桥良好基牙的最重要的指标是

- A. 牙槽骨的量
- B. 牙槽骨的密度
- C. 牙周膜面积
- D. 牙根长度
- E. 牙根数目

答案：C

解析：

23. 选择固定桥基牙时不必考虑的因素是

- A. 牙周膜
- B. 牙槽骨
- C. 对侧牙的情况
- D. 根形态
- E. 根长

答案：C

解析：基牙选择十分重要，应充分考虑基牙自身条件以及牙周组织健康状况。

24. 关于固定桥的说法，错误的是

- A. 基牙和人工牙是一个功能整体

B. 各基牙之间有共同的就位道

C. 桥体部分和黏膜紧密接触

D. 桥力通过基牙传递给牙周支持组织和骨

E. 分为双端固定桥、半固定桥、单端固定桥

以及复合固定桥

答案：C

解析：

25. 以下关于双端固定桥固位体的说法中，错误的是

- A. 两端的固位体固位力相似
- B. 固位体固位力与桥体跨度相适应
- C. 固位体固位力与牙力大小相适应
- D. 共同就位道与牙长轴平行
- E. 有共同就位道

答案：D

解析 固位体设计中应注意：①提高固位体的固位力；②基牙两端的固位体固位力应基本相等；③固位体固位力大小应与力的大小、桥体的跨度和桥体的曲度相适应；④固位体之间的共同就位道。







26. 固定桥修复一段时间后出现咬合痛，应

先做的辅助检查是

- A. 测试基牙牙髓活力
- B. 检查牙松动度
- C. 拍 X 线片
- D. 检查对颌牙
- E. 颅脑 CT 检查

答案：C

解析：固定桥修复一段时间后出现咬合痛常常是因为咬合创伤、根尖周疾病等，检查的有效方法是拍摄 X 线片以检查根尖及牙周组织有无异常。

27. 在相同条件下，如果固定桥桥体的厚度减半，则其挠曲变形量变为

- A. 增加至原来的 2 倍
- B. 增加至原来的 4 倍
- C. 增加至原来的 6 倍
- D. 增加至原来的 8 倍
- E. 增加至原来的 9 倍

答案：D

解析：

28. 以下不是固定桥组成部分的是

- A. 固位体
- B. 小连接体
- C. 桥体
- D. 活动连接体
- E. 固定连接体

答案：B

解析：

29. 关于基牙条件的叙述，错误的是

- A. 基牙最好是健康活髓牙
- B. 基牙牙冠(牙合)龈高度适当
- C. 多根基牙的根分叉度越大越好
- D. 基牙牙槽骨吸收不能超过根长 1/2
- E. 单根牙中固位力最大的为上颌尖牙

答案：D

解析：固定桥修复时基牙最好是健康活髓牙，其牙冠牙龈高度适当，牙根粗壮并有足够长度，牙根周围骨吸收不超过根长的 1/3，基牙位置基本正常。







30.对下颌双侧游离端可摘局部义齿基托的

A.人工牙、𬀪支托

要求中，错误的是

B.(牙合)支托、基托

A.颊舌侧边缘伸至黏膜转折处

C.固位体、人工牙

B.应有良好的边缘封闭作用

D.连接体、基托

C.后缘应盖过磨牙后垫

E.人工牙、基托、(牙合)支托

D.边缘应圆钝，不刺激黏膜

答案：E

E.不妨碍颊舌的功能活动

解析：

答案：C

解析：该类型义齿的后缘应位于磨牙后垫的

33.下列不𦨭可摘局部义齿部件的是

1/2~2/3。

A.固位体

31.前牙支托凹位于

B.桥体

A.切角

C.𬀪支托

B.切缘

D.邻面板

C.舌侧颈 1/3

E.基托

D.舌侧中 1/3

答案：B

E.舌侧颈 1/3 和中 1/3 交界处

解析：

答案：E

34.卡环需用对抗臂的主要目的是

解析：

A.加强固位作用

32.可摘局部义齿的组成其修复缺失的部分

B.加强稳定作用

是

C.防止义齿移位

D.防止基牙移位



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.防止义齿摆动

答案：A

答案：D

解析：

解析：卡环臂，多用钢丝弯制，其末端弹性

较大的部分，进入基牙倒凹区起固位作用。

使用单臂卡环时，舌（腭）侧须用基托对抗，

以防止基牙受力移位。

37.设计隙卡制备牙体时，不能预备成楔形，

也不能破坏两相邻牙的接触点，这样做的原

因是

A.尽量利用天然间隙

B.防止基牙间食物嵌塞

C.尽量少磨除牙体组织

D.防止基牙龋坏

E.避免形成楔力使基牙移位

35.卡环臂尖位于基牙的

A.外形高点线上

B.外形高点线(牙合)方

C.外形高点线龈方

D.导线的(牙合)方

E.导线的龈方

答案：E

解析：

答案：E

解析：

38.Kennedy 第一类缺损应采用

A.解剖式印模

B.功能性印模

C.无压力印模法

D.印模胶印模法

E.开口印模法

36.一型观测线的特点是

A.基牙近缺陷侧倒凹小，远缺陷侧倒凹大

B.基牙近缺陷侧倒凹小，远缺陷侧倒凹也小

C.基牙近缺陷侧倒凹大，远缺陷侧倒凹小

D.基牙近缺陷侧倒凹大，远缺陷侧倒凹也大

E.基牙颊侧倒凹大，舌侧倒凹小

答案：B

解析：解剖式印模法，不采用肌功能整塑，



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



用于对颌牙列；功能性印模法，采用肌功能整塑，更真实反映口腔组织情况，有较好的边缘伸展。

- C.游离鞍基的下沉量  
D.牙槽嵴的高低  
E.牙槽嵴黏膜的厚度

答案：E

39.杆形卡环与圆环形卡环相比较主要的不足之处是

解析：

- A.稳定作用差  
B.固位作用差  
C.美观作用差  
D.弹性作用差  
E.对基牙损伤大

41.上颌 Kennedy 第一类牙列缺损者可以采取单侧分别设计的病例是

- A.87|78  
B.876|45678  
C.87642|3678  
D.87|3678  
E.8765|78

答案：A

答案：A

解析：杆形卡环的形状和种类很多，弹性好，

解析：

和基牙的接触面积小，故对基牙的损伤小，

答案：A

锥形固位作用强。也因和基牙的接触面积小，稳定作用不如圆形卡环。

解析：

40.Kennedy 第一类牙列缺损者，选用混合支持式义齿，游离端鞍基左右摆动的影响因素一般不考虑  
A.侧向(牙合)力的大小  
B.牙尖斜度的大小

42.修复 Kennedy 第一类、第二类缺损的主要难点是

要难点是

- A.防止义齿对基牙损伤  
B.防止义齿对牙槽嵴损伤  
C.防止义齿沿支点线旋转  
D.防止义齿(牙合)向移位



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



E.防止义齿龈向移位

答案：C

解析：

43.Kennedy 第三类单侧多个后牙缺失，余留牙健康，可摘局部义齿的支点线应设计成

A.斜线式

B.直线式

C.横线式

D.平面式

E.纵线式

答案：D

解析：

44.全口义齿合适的凹形磨光面形态可以

A.降低咀嚼效能

B.使发音清晰

C.帮助义齿固位

D.避免咬颊、咬舌

E.增加面部丰满度

答案：C

解析：

45.咬合位垂直距离是指

A.瞳孔连线到口裂间的距离

B.天然牙列上、下牙接触时，鼻底到颏底的

距离

C.上、下颌牙槽嵴顶之间的距离

D.天然牙列位于正中(牙合)位时鼻底至颏底的距离

E.无牙颌上、下颌之间的距离

答案：D

解析：

46.以下关于颌位记录，错误的说法是

A.用(牙合)托确定和记录患者面下 1/3 的适

宜高度

B.颌位关系记录包括垂直关系和水平关系

记录两部分

C.所确定的颌位上下颌关系是息止(牙合)关系

D.恢复两侧髁突在下颌关节凹生理后位的上下颌关系

E.便于在这个上下颌骨的位置关系上重建



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



患者的正中(牙合)关系

B.纠正不良的咬合习惯

答案：C

C.可以先练习咀嚼小块食物

解析：

D.使用时要保护口腔组织健康

E.睡觉时将义齿摘下，浸泡于消毒药水中

47.全口义齿初戴时，选磨方式错误的是

答案：E

A.选磨正中(牙合)早接触时，主要选磨与早接触支持尖相对应的近远中边缘嵴和中央窝

解析：

B.选磨侧方(牙合)干扰时，选磨非支持尖上的(牙合)干扰点

49.全口义齿初戴一段时间需要再调(牙合)，是因为

C.选磨侧方(牙合)干扰时，如为尖牙的干扰通常以选磨上尖牙为主

A.全口义齿固位明显加强

D.前伸(牙合)不干扰时，如前牙接触而后牙不接触时，选磨以下前牙唇斜面为主

B.义齿基托长短已可确定

C.义齿咬合平衡已经建立

E.前伸(牙合)不干扰时，如后牙接触而前牙不接触时，选磨上牙尖的远中斜面或下牙尖的近中斜面

D.由于(牙合)力的作用，出现基托下沉

E.患者已经可以用新义齿咀嚼食物

答案：C

答案：D

解析：

解析：

48.下列戴牙指导中错误的是

50.全口义齿初戴，软组织面不易出现疼痛的部位是

A.增强义齿的使用信心

A.牙槽嵴上有骨尖骨突的部位

B.上颌隆突、上颌结节的腭侧

C.下颌舌隆突等骨质隆起处



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.有组织倒凹的区域

E.外伤

E.下颌舌骨嵴覆盖黏膜较薄的区域

答案：D

答案：B

解析：

解析：该题答案上颌隆突、上颌结节的腭侧

错误，应为颊侧，容易选择干扰答案 D。

53.全口义齿初戴而未咀嚼时固位良好，与

下列因素关系最大的是

51.全口义齿人工牙排列成平衡(牙合)，主要

是为了

A.印模是否准确

B.颌位记录是否准确

A.增强义齿固位

C.颌弓关系是否正常

B.防止咬颊、咬舌

D.排牙位置是否正确

C.提高咀嚼效率

E.基托边缘伸展是否合适

D.提高义齿稳定

答案：A

E.有利于美观

解析：

答案：D

解析：

54.全口义齿初戴，与义齿稳定无关的因素

是

52.导致拔牙的牙槽窝早期迅速吸收的最可

能的原因是

A.良好的咬合关系

B.适当的基托伸展

A.龋齿

C.理想的磨光面形态

B.根尖周病

D.合理的人工牙排列

C.拔牙

E.具有平衡(牙合)

D.牙周病

答案：B



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





解析:患者的口腔解剖形态、唾液的质和量、

E.积极治疗口腔疾病

基托面积大小、边缘伸展等因素均与义齿固

答案:A

位有关。影响全口义齿的稳定因素有良好的

解析:

咬合关系、合理的排牙、理想的基托磨光面

形态。

57.对口腔健康教育不正确的认识是

A.是口腔预防保健项目

55.1981年WHO制定的口腔健康标准是

B.是口腔公共卫生的基础

A.牙健康是牙、牙周组织、口腔邻近部位及

C.是传递科学信息的途径

颌面部均无组织结构与功能性异常

D.是争取领导支持的方法

B.牙清洁,无龋洞,无疼痛感,牙龈颜色正

E.是提高健康意识的手段

常,无出血现象

答案:D

C.无龋齿、牙周疾病

解析:

D.无牙体、牙周、黏膜疾病

E.牙清洁,无结构与功能异常

58.全国第二次口腔流行病学调查显示,12

答案:B

岁儿童窝沟龋与平滑面龋的患龋比例是

解析:

A.4:1

B.6:1

56.口腔健康教育的最终目的是

C.7:1

A.建立口腔健康行为

D.8:1

B.增长口腔保健知识

E.9:1

C.定期口腔健康检查

答案:E

D.了解口腔保健措施

解析:



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





59.沟裂狭窄而长，底部膨大，朝向牙釉质

牙本质界的窝沟是

A. “P” 形窝沟

B. “V” 形窝沟

C. “U” 形窝沟

D. “” 形窝沟

E. “C” 形窝沟

答案：D

解析：窝沟可简单地分为两类：①浅、宽的 V 形沟；②深而窄的 I 形沟。后者沟裂狭窄而长，类似瓶颈，底端膨大朝向釉质牙本质界。

60.牙周疾病二级预防的内容不包

A.专业性洁治

B.去除菌斑和牙石

C.去除不良修复体

D.义齿修复失牙

E.治疗食物嵌塞

答案：D

解析：

61.以下措施不属牙周病三级预防的是

A.治疗牙周脓肿

B.袋内刮治和根面平整

C.拔除不能保留的患牙

D.纠正不良习惯

E.牙周手术治疗

答案：D

解析：

62.下列关于牙周病三级预防，正确的说法是

A.一级预防又称“三早”预防

B.二级预防又称病因预防

C.定期 X 线检查属于一级预防

D.去除不良修复体属于二级预防

E.修复失牙属于二级预防

答案：D

解析：

63.社区人群牙周健康的重要判断标准是

A.牙龈点彩消失

B.牙龈颜色异常





C.牙龈红肿

答案：D

D.牙龈出血

解析：

E.牙周袋溢脓

答案：D

66.氟的防龋机制不包括

解析：

A.牙釉质溶解性增加

B.抑制烯醇酶

64.世界范围内使用氟化物防龋，估计人数

C.促进再矿化

最多的措施是

D.抑制细菌产酸

A.饮水加氟

E.影响牙外形

B.含氟牙膏

答案：A

C.食盐氟化

解析：该题是基础理论记忆题。氟化物的防

D.局部涂氟

龋机制包括：降低牙釉质溶解度和促进牙釉

E.氟水漱口

质再矿化；对微生物的抑制作用；影响牙的

答案：B

形态学结构，增强牙的抗龋能力。其对微生

解析：

物的抑制作用包括氟化物的抑制与糖酵解

65.急性氟中毒抢救处理的强效方法是

和细胞氧化有关的酶，如烯醇酶、琥珀酸脱

氢酶等；抑制细菌摄入葡萄糖和抑制细菌产

A.催吐

酸；影响细菌对氟的摄取。考生应详细记忆

B.补钙

氟化物的防龋机制。

C.补液

67.使用期最长的消毒液是

D.人工呼吸

A.酒精

E.洗胃



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



B.戊二醛

答案：C

C.碘伏

解析：该题是基础理论记忆题，备选答案是

D.过氧乙酸溶液

窝沟封闭剂脱落的各种原因，包括清洁不彻

E.次氯酸钠溶液

底，酸蚀后冲洗不彻底，酸蚀后唾液污染等。

答案：B

考生学习了解窝沟封闭的操作方法与步骤，

解析：

各项操作注意事项会影响窝沟封闭剂的防

68.美国环境保护署推荐的表面消毒液是

治效果，其中，酸蚀后封闭之前牙表面干燥

A.酒精

B.次氯酸钠溶液

70.首选的灭菌方法中有

C.戊二醛溶液

A.高压蒸汽

D.过氧乙酸溶液

B.化学熏蒸

E.氯己定溶液

C.干热灭菌

答案：B

D.化学浸泡

解析：

E.紫外线

69.窝沟封闭剂脱落的最主要原因是

答案：A

解析：

A.清洁不彻底

B.酸蚀后冲洗不彻底

71.关于氯己定，正确的说法是

C.酸蚀后唾液污染

A.氯己定具有二价阴离子活性

D.固化后有气泡

B.对细菌表面有亲和力

E.封闭剂太厚

C.对革兰氏阳性菌无抑制作用



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.对放线菌作用不显著

E.是一种生物学控制菌斑的方法

答案：B

解析：

72.属于化学性控制菌斑的方法是

A.抗菌剂

B.氯己定

C.茶多酚

D.酶类

E.甲壳素

答案：B

解析：

73.“社区牙周指数”不包括

A.牙龈出血

B.牙结石

C.牙槽骨吸收

D.浅牙周袋

E.深牙周袋

答案：C

解析：

74.WHO 龋病流行程度属低的标准是

A.0.0 ~ 1.1

B.1.2 ~ 2.6

C.0.5 ~ 1.5

D.1.5 ~ 2.5

E.2.7 ~ 4.4

答案：B

解析：

75.以往牙周疾病流行病学资料少的重要原

因是

A.缺乏明确的标准和指数

B.牙周资料的可比性差

C.牙周资料的可靠性差

D.牙周疾病流行病学研究少

E.缺乏牙周资料的收集和整理

答案：A

解析：

76.影响牙周疾病流行的最主要因素是

A.吸烟与饮酒



更多医师考试资料



微信搜一搜

金英杰口腔学院



B.受教育程度

C.年龄和性别

D.口腔卫生状况

E.城乡差异

答案：D

解析：

77.患者，女，35岁。自诉后牙松动来我院

求治。检查发现|6根分叉完全暴露，水平方

向可穿通。X线片示：牙根周围明显骨丧失。

对其根分叉病变分类正确的是

A.一类根分叉病变

B.二类根分叉病变

C.三类根分叉病变

D.四类根分叉病变

E.五类根分叉病变

答案：D

解析：

78.患者，男，38岁。|8重度伸长，无对颌

牙，上颌对应位置牙龈红肿，可见咬合印迹。

合理的处理方式是

A.|8根管治疗后截冠

B.|8(牙合)面调磨

C.拔除|8

D.|8截冠后，上颌活动义齿修复|8

E.|8全冠修复

答案：C

解析：对于重度伸长且没有对颌牙的第三磨

牙，可以考虑拔除。

79.患者，7|牙髓健康，(牙合)龈距离短，近

中带远中银汞合金充填，远中食物嵌塞。最

佳的治疗设计是

A.直接全冠修复

B.嵌体修复

C.去髓后桩冠修复

D.直接3/4冠修复

E.金属冠修复

答案：B

解析：

80.患者，1|牙列拥挤、严重扭转并伴有轻

度唇侧倾斜，牙体组织及牙周健康。患者要



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



求快速解决前牙美观问题，最佳的治疗方案为

A.拔除后固定桥修复

B.拔除后可摘局部义齿修复

C.拔除后种植义齿修复

D.根管治疗后桩冠修复

E.根管治疗后覆盖义齿修复

答案：D

解析：

81.患者，男。|7牙髓坏死，经根管治疗后

以属烤瓷全冠修复，在牙体预备取模后至属烤瓷冠初戴之间，尚需

A.用塑料全冠作保护性修复

B.用金属全冠作保护性修复

C.带环作保护性修复

D.用牙龈保护剂保护牙龈

E.不作任何处理

答案：A

解析：

82.患者，司已行根管治疗，原银汞充填物

经脱落，现要求全冠修复。检查：无叩痛松

动，咬合距离正常，临床牙冠较高。不采用

的修复方法是

A.铸造金属全冠

B.塑料全冠

C.金属烤瓷全冠

D.高强度全瓷冠

E.嵌体

答案：B

解析：

83.患者，男。|6邻(牙合)银汞充填，剩余颊舌壁体组织较多，但牙冠高度较低。若行全

修复，以下增加固位的措施中错误的是

A.龈下边缘

B.颊、舌轴面预备轴沟

C.设计嵌体冠

D.增加钉洞或箱型辅助固位形

E.在轴壁上制备倒凹

答案：E

解析：在轴壁制备倒凹会影响全冠就位。







84.患者,男,30岁。 $\overline{17}$ 游离缺失,患者要

解析:

行固定义齿修复,欲采用单端固定桥修复,

不需要满足的条件是

A.以第二前磨牙和第一磨牙为基牙

B.基牙牙周状况良好

C.缩小 $\overline{17}$ 的近远中径

D.缩小 $\overline{17}$ 的颊舌径

E.增加 $\overline{17}$ 的近远中径

答案:E

解析:增加37的近远中径会增加基牙收到

的扭力,不利于修复体的长期保存及基牙健

康。

86.患者,Ⅱ缺失,间隙正常,患者要求行

固定义齿修复,最合理的设计为

A. $\overline{1357}$ 作基牙的固定桥

B. $\overline{135}$ 双端固定桥修复 $\overline{6}$ 单端固定桥修复 $\overline{6}$

C. $\overline{135}$ 单端固定桥修复 $\overline{6}$ 单端固定桥修复 $\overline{6}$

D. $\overline{13}$ 单端固定桥修复 $\overline{6}$  $\overline{457}$ 双端固定桥修

复

E. $\overline{12357}$ 作基牙的固定桥

答案:A

解析:

85.患者,男,40岁 $\overline{16}$ 缺失,间隙正常, $\overline{17}$

舌侧倾斜较大。最佳的设计方案是

A. $\overline{14}$ 、 $\overline{15}$ 做联冠的单端固定桥

B. $\overline{15}$ 做全冠的单端固定桥

C. $\overline{15}$ 做全冠, $\overline{17}$ 作颊面牙体预备的3/4冠双

端固定桥

D. $\overline{15}$ 做全冠, $\overline{17}$ 作(牙合)面放置(牙合)支托

E. $\overline{15}$ 、 $\overline{17}$ 做全冠的双端固定桥

答案:C

87.患者, $\overline{146}$ 缺失,拟行 $\overline{1357}$ 作基牙的固

定桥修复,对于 $\overline{15}$ 固位体的选择最合适的是

A.嵌体

B.粘接冠

C.全冠

D.3/4冠

E.7/8冠

答案:C

解析:作为桥基牙,固位力非常重要,而全



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





冠是所有选项中提供固位力最大的。

88.患者,女,40岁。 $\overline{654|}$ 缺失,余留牙无松动。不正确的说法是

90.患者,女,50岁。 $\overline{86|67}$ 缺失,余留牙无明显松动,口底深度大于8mm,无较大的骨突,舌侧牙槽嵴无明显倒凹。正确的说法是

- A.上颌为 Kennedy 第三类牙列缺损
- B.在缺牙区对侧牙弓上设置直接固位体
- C.义齿应呈面支承式
- D.应采用牙支持式的设计
- E.应采用黏膜支持式设计

答案:E

解析:

- A.下颌为 Kennedy 第一类第一亚类牙列缺损
- B.可设计舌杆
- C.应设计舌板
- D.应设计黏膜支持式
- E.拔除余留牙

答案:B

解析:

89.患者,男,49岁。 $\overline{8654|4568}$ 缺失,余留牙无松动。不正确的说法是

- A.上颌为 Kennedy 第三类第一亚类牙列缺损
- B.可采用后腭杆前腭板相连的设计
- C.可采用前腭板的设计
- D. $\underline{3|3}$ 上设卡环
- E. $\underline{7|7}$ 上设(牙合)支托

答案:C

解析:

91.患者,男,78岁。 $\overline{8-5|5-8}$ 缺失,余留牙无明显松动,口底深度大于8mm,无较大的骨突,缺牙区牙槽嵴吸收,牙槽嵴呈垂直型。不正确的说法是

- A.下颌为 Kennedy 第一类牙列缺损
- B.可设计舌杆
- C.可设计连续舌杆
- D.舌杆与黏膜应平行接触



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



E.应设计舌板

B.活动设计应采用牙支持式.

答案：E

C.应采用天然牙固定桥修复

解析：

D.可直接采用套筒冠修复

E.修复前应治疗龋齿

92.患者，女，68岁。 $\overline{8-4}|4-8$ 缺失，余

答案：E

留前：牙度松动，口底较浅、舌侧软组织附

解析：

丽高、舌隆突明显。下列说法正确的是

A.下颌为 Kennedy 第一类第一亚类牙列缺

94.患者，女，50岁。上颌牙列缺损，下颌

损

牙列缺失，就诊期间焦虑多话，情绪波动较

B.应设计舌杆

大，暴躁易怒。该患者不太可能出现的情况

C.应设计舌板

是

D.舌板应覆盖在下颌舌隆突之下，进入舌间

A.骨质疏松

外展隙

B.牙槽骨吸收较快

E.义齿基托应尽量小

C.口干、烧灼感

答案：C

D.适应力差

解析：

E.月经不调

答案：E

93.患者，男，40岁。 $\overline{7632}|245$ 缺失，余

解析：更年期特征。

留牙度松动，有广泛的龋齿，牙槽骨吸收至

根中 3/5。下列说法正确的是

95.患者，女，55岁。上颌牙列缺失，双侧

A.上颌为 Kennedy 第三类第一亚类牙列缺

上颌结节较大，上前牙区牙槽嵴略有倒凹。

失

对该患者的处理正确的是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.手术修整双侧上颌结节后制作全口义齿

B.手术修整单侧上颌结节、缓冲对侧义齿基托

托

C.手术修整上颌前牙区倒凹

D.不做手术，缓冲双侧义齿基托

E.不做手术，改变义齿就位方向

答案：B

解析：

96.患儿，男，2岁。由父母亲陪同去口腔科就诊，母亲要求医生为小孩做乳牙窝沟封闭，医生认为该小孩目前不需做窝沟封闭，其主要原因是

A.乳牙不需做窝沟封闭

B.现阶段儿童不易患龋

C.封闭剂的氟释放，儿童易误吞造成氟中毒

D.乳牙窝沟封闭年龄一般应为3~4岁

E.乳牙有机质多，封闭剂易脱落

答案：D

解析：

97.患者，13岁。2岁前生活在高氟区，以

后随父母迁居低氟区，其相应可能出现氟牙症的恒牙是

A.前牙和第一磨牙

B.第一前磨牙和第一磨牙

C.前牙、第一前磨牙和第一磨牙

D.全口牙都可能出现氟牙症

E.没有氟牙症

答案：A

解析：氟牙症多发生于恒牙，乳牙很少见。

患氟牙症牙数的多少取决于牙发育矿化时期在高氟区生活时间的长短，出生前至出生后在高氟区居住多年，可使全口牙受侵害；如两岁前生活在高氟区，以后迁移至非高氟区，恒牙氟牙症可表现在前牙和第一恒磨牙；

如果6~7岁之后迁移至高氟区，则不出现氟牙症。

98.某同学准备去幼儿园对儿童进行口腔健康教育，在准备口腔健康教育材料时教授提醒他应特别注意内容应具有，除外

A.准确性

B.知识性



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



C.创新性

D.趣味性

E.艺术性

答案：C

解析：

99.预防口腔医学教学中，老师强调临床控制交叉感染的重点是

A.手部的消毒

B.空气的消毒

C.地表的消毒

D.机头的消毒

E.废物的处理

答案：D

解析：

100.在科室预防交叉感染的讨论会上，大家提出了很多好的建议，特别强调要做的是

A.更换所有器械物品

B.更换所有消毒液

C.认真学习消毒常识

D.加强感染的监测与控制

E.查找污染源和设计消毒程序

答案：D

解析：

101.患者，女。担心使用牙签会使牙缝增宽，医生告诉她正确使用牙签的方法是

A.轻轻置入龈沟底部，向龈方运动清洁

B.轻轻置入龈沟底部，向冠方运动清洁

C.置入牙间隙，轻轻上下运动清洁

D.置入牙间隙，轻轻左右运动清洁

E.视需要向各个方向运动清洁

答案：B

解析：这是一道实际应用题，考生应详细记

忆牙签的使用方法。将牙签以45°角进入

牙间隙，牙签尖端指向(牙合)面，侧面紧贴

邻面牙颈部，向船方剔起，或做颊舌向穿刺

动作，消除邻面菌斑和嵌塞的食物，并抛光

牙面，然后漱口。

102.口腔健康调查前的准备阶段，技术组专

家告诫调查人员，出现信息偏性的重要原因

是



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



A.漏查了一些受检者

C.3 个月

B.检查对象代表性差

D.2 个月

C.检查器械不统一

E.6 个月

D.标准掌握不一致

答案：C

E.受检者回忆有偏差

解析：该时期骨水平基本稳定，是固定修复

答案：C

的最佳时期。

解析：

105.前牙外伤牙折，根管治疗后至开始桩冠

103.患者，男，20 岁。上颌中切牙牙釉质

修复至少需要

的白色不透明区占牙面的 1/2 以下，按

A.1 周

Dean 氟牙症记分为

B.1 个月

A.0

C.3 个月

B.0.5

D.2 个月

C.1

E.6 个月

D.2

答案：A

E.3

解析：

答案：D

解析：

106.活动义齿修复至少应在拔牙后多长时

间

104.固定修复的最佳时机是拔牙后

A.1 周

A.1 周

B.1 个月

B.1 个月

C.3 个月



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.2 个月

答案：E

E.6 个月

解析：

答案：B

解析：

109.桩的直径一般为根直径的

A.1/4

107.桩在牙槽骨内的长度应大于根在牙槽

B.1/3

骨内总长度的

C.2/3

A.1/4

D.1/5

B.1/3

E.1/2

C.2/3

答案：B

D.1/5

解析：

E.1/2

答案：E

110.牙体预备时应尽量保证的牙本质肩领

解析：

为

A.1mm

108.鸠尾峡的宽度应为前磨牙颊舌尖宽度

B.1.5mm

的

C.2mm

A.1/4

D.2.5mm

B.1/3

E.3mm

C.2/3

答案：B

D.1/5

解析：

E.1/2



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



111.金属烤瓷固定桥桥体支架应留的瓷层 的进行间隙为

厚度为

A.1mm

A.1mm

B.1.5mm

B.1.5mm

C.2mm

C.2mm

D.2.5mm

D.2.5mm

E.3mm

E.3mm

答案：E

答案：B

解析：留出 3mm 间隙便于清洁。

解析：

114.全口义齿使用多久后应修改、重衬

112.金属烤瓷固定桥桥体金属龈端与牙槽

A.3~4 年

嵴复至少需要黏膜之间至少为瓷层留有的

B.5~6 年

间隙是

C.7~8 年

A.1mm

D.9~10 年

B.1.5mm

E.10 年以上

C.2mm

答案：A

D.2.5mm

解析：

E.3mm

答案：A

115.一副全口义齿的使用寿命应是

解析：

A.3~4 年

B.5~6 年

113.悬空式桥体与牙槽嵴黏膜之间应留有

C.7~8 年



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





D.9~10 年

E.10 年以上

答案：C

解析：

116.ART 恒牙修复使用

A.树脂条

B.T 形带

C.I 形带

D.金属成形片

E.不需要

答案：A

解析：

117.ART 乳牙修复使用

A.树脂条

B.T 形带

C.I 形带

D.金属成形片

E.不需要

答案：B

解析：

118.酚类化合物控制牙菌斑的机制是

A.抑制细菌酶

B.干扰牙菌斑的附着

C.清除牙菌斑中内毒素

D.改变细菌胞膜的通透性

E.影响牙菌斑繁殖

答案：C

解析：这是基础理论记忆题。本题考查药物控制菌斑的机制，其中酚类化合物，又称香精油，它能清除菌斑中的内毒素，明显降低菌斑的活性。

119.季铵化合物控制牙菌斑的机制是

A.抑制细菌酶

B.干扰牙菌斑的附着

C.清除牙菌斑中内毒素

D.改变细菌胞膜的通透性

E.影响牙菌斑繁殖

答案：D

解析：季铵化合物是一组阳离子表面活性剂，能杀灭革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌，其机



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



制是作用于细胞膜而影响其渗透性，最终使

细胞内容物丧失。

122.推断两个样本各自代表的两总体率是

否相等是

120.通过单一样本数据推断两种处理结果

有无差别是

A.样本率与总体率比较的目的

B.配对计数资料比较的目的

C.两个样本率比较的目的

D.多个样本率做比较的目的

E.将两个或多个样本构成比做比较的目的

答案：B

解析：

A.样本率与总体率比较的目的

B.配对计数资料比较的目的

C.两个样本率比较的目的

D.多个样本率做比较的目的

E.将两个或多个样本构成比做比较的目的

答案：C

解析：

121.推断样本率所代表的总体率与总体率

是否相等是

A.样本率与总体率比较的目的

B.配对计数资料比较的目的

C.两个样本率比较的目的

D.多个样本率做比较的目的

E.将两个或多个样本构成比做比较的目的

答案：A

解析：

123. ( 123-127 题共用题干 ) 患者，男，

62 岁。 $\overline{17}$ 健康，近中舌侧倾斜，余牙缺失。

牙槽嵴丰满，上颌散在骨尖，颌间距离正常。

修复前应做的工作是

A.拔除 $\overline{17}$

B.行牙槽嵴修整术

C.行唇颊沟加深术

D.去骨尖

E.牙周洁治

答案：D

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



124.制取印模方式

A.上颌取功能性印模，下颌取解剖式印模

B.上颌取解剖式印模，下颌取功能性印模

C.上下颌均取功能性印模

D.上下颌均取解剖式印模

E.根据现有印模材料选择

答案：C

解析：

125.帮助患者下颌自然回到正中关系位，下面方法不正确的是

A.肌肉疲劳法

B.吞咽咬合法

C.卷舌后舔法

D.后牙咬合法

E.面部外形观察法

答案：E

解析：面部外形观察法用于确定垂直距离。

126.义齿不需缓冲的区域是

A.上颌硬区

B.下颌隆突

C.腭皱

D.下颌舌骨嵴

E.上颌颊系带

答案：C

解析：

127.与义齿固位关系最密切的因素是

A.印模是否准确

B.颌位记录是否正确

C.排牙位置是否正确

D.基托边缘伸展

E.人工牙选择

答案：A

解析：

128. (128-130 题共用题干) 患者，男，65 岁。6|冠部严重缺损，仅余留颊侧及近

中壁，远中壁位于龈上，舌侧壁位于龈；下1mm。X 线显示已行完善的根管治疗。如

果该患者冠根比例大，应将冠边缘设计在

A.平齐龈缘



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



B.龈缘以上

道

C.龈缘以下 1mm

E.根据对颌牙的方向确定就位道

D.龈缘以下 2mm

答案：D

E.龈缘以下 0.5mm

解析：

答案：B

解析：

131. ( 131-135 题共用题干 ) 患者，男，

40 岁。因龋坏拔除  $\overline{71}$ ，要求修复。若检查

129.如果可原来存在水平性食物嵌塞，在设

见  $\overline{81}$  健康且位置正常， $\overline{61}$  健康，咬合、牙周

计时应

情况良好，最佳修复方案是

A.选择合适的修复方式

A.  $\overline{61}$  单端固定桥

B.选择合适的修复材料

B.  $\overline{861}$  双端固定桥

C.选择合适的边缘位置

C.  $\overline{8651}$  双端固定桥

D.考虑食物流向的控制

D.  $\overline{651}$  单端固定桥

E.选择合适的就位方向

E.活动桥修复

答案：D

答案：B

解析：

解析：

130.如果可向舌侧倾斜，如何选择就位道

132.若检查发现  $\overline{81}$  缺失， $\overline{61}$ 、 $\overline{51}$  健康，咬合、

A.根据牙体预备的方向确定就位道

牙周情况良好，最佳固定修复方案是

B.根据桩核的方向确定就位道

A.  $\overline{61}$  单端固定桥

C.根据患牙的方向确定就位道

B.  $\overline{861}$  双端固定桥

D.根据患牙的方向及邻牙的情况确定就位

C.  $\overline{8651}$  双端固定桥



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院



D.  $\overline{65}$ |单端固定桥

答案：D

E.活动桥修复

解析：

答案：D

解析：

135.固定桥选择带桩核的根桩固位体，其优越性在于

133.若检查见 $\overline{8}$ |健康且位置正常， $\overline{6}$ | (牙合)面至远中邻面深龋，持续性钝痛，最佳修复方案是

A.提高固位力  
B.更容易获得共同就位道  
C.制作简单

A.  $\overline{6}$ |根管治疗后行+ $\overline{76}$ |单端固定桥修复

D.A+B

B.  $\overline{6}$ |根管治疗后 $\overline{765}$ |单端固定桥修复

E.A+B+C

C.  $\overline{6}$ |根管治疗后桩核+ $\overline{876}$ |双端固定桥修复

答案：D

D.  $\overline{6}$ |根管治疗后桩核+ $\overline{765}$ |单端固定桥修复

解析：

E.暂不修复

答案：C

136. ( 136~139 题共用题干 ) 患者，男，

解析：

65 岁。 $\overline{65}$ 、 $\overline{876}$ |45缺失。但 $\overline{8}$ 残根，牙槽骨吸收至根分叉以下，松动Ⅱ度。 $\overline{6}$ 近中(牙合)面龋，探痛(-)。余留牙卫生状况差，无松动。右侧下颌隆突明显、倒凹大。以下

134.做后牙桩可选择的方案是

A.成品金属桩

操作欠妥的是

B.间接法取模制作桩核

C.制作分瓣桩核蜡型做铸造桩核

A.拔除 $\overline{8}$ 残根

D.A+B+C

B.牙周洁治

E.纤维桩

C.治疗匠龋坏





D.全口 X 线片

答案：A

E.手术修整右侧下颌隆突

解析：

答案：D

解析：

139.以下描述错误的是

A.上颌义齿主要为牙支持式

B.上颌牙列缺损属于 Kennedy 第三类

C.下颌大连接体可设计为舌杆

D.下颌小连接体为(牙合)支托

E.下颌印模为压力印模

答案：D

解析：

137.下颌可摘局部义齿修复时，基牙一般选择

A.  $\overline{5|36}$

B.  $\overline{4|36}$

C.  $\overline{5|367}$

D.  $\overline{4|367}$

E.  $\overline{3|36}$

答案：A

解析：

140. ( 140-142 题共用题干 ) 患者，男，

50 岁。戴用上半口义齿半年后出现前牙区

黏膜疼痛，但因个人原因一直未复诊修改义

齿。检查见上前牙前庭区黏膜增生呈多褶状，

上唇系带部明显，义齿唇侧基托压迫增生的

黏膜组织。对增生黏膜组织的处理应该是

A.待其自行消失

B.手术切除增生的黏膜组织

C.重新制作义齿

D.调磨义齿唇侧基托，观察

138.制备铸造(牙合)支托时，描述错误的是

A.呈匙形，厚而宽

B.长度约为 1/4 磨牙或 1/3 前磨牙的近远中径

C.宽度约为 1/3 磨牙或 1/2 前磨牙的颊舌径

D.厚度为 1~1.5mm

E.(牙合)支托应具有刚性



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





E.重衬义齿

答案：D

解析：

C.调磨义齿，继续观察，待增生的黏膜组织

基本消失后继续戴用旧义齿

D.调磨义齿，继续观察，待增生的黏膜组织

基本消失后重新制作义齿

141.患者发现增生的黏膜组织后，若戴用义

齿，至今增生的组织未能自行消失，正确的

处理方法应该是

A.继续观察，待其自行消失

B.手术切除增生的黏膜组织

C.重新制作义齿

D.调磨义齿唇侧基托，观察

E.重衬义齿

答案：B

解析：

E.以上方法皆可，征求患者的意见

答案：D

解析：义齿导致黏膜组织增生应修改义齿边

缘，停戴义齿，待组织恢复。

143.( 143-145 题共用题干 )口腔预防科在

某小学人群中验证一种含氟牙膏的防龋效

果，对于研究方案的几个问题经讨论后确定

下来。由于学校学生是以班级为单位学习和

活动，因此，试验分组按自然排列的顺序

A.系统分组

B.随机分组

C.分层分组

D.整群分组

E.顺序分组

142.若患者停戴义齿 1 个月后，发现增生黏

膜组织有恢复的趋势，此时对患者的建议应

该是

A.手术切除剩余的增生黏膜组织，调磨旧义

齿继续使用

B.手术切除剩余的增生黏膜组织，重新制作

义齿

答案：A

解析：本题是一道口腔流行病学应用的综合性

题目。根据题干提示，本题目的调查类型属



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院





于抽样调查，抽样调查包括单纯随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样和多级抽样。本题题干中按班级进行调查属于按次序编号进行随机抽取调查对象的抽样形式，故应为系统抽样或系统分组调查。

B.3 年级

C.4 年级

D.5 年级

E.6 年级

答案：B

解析：由于调查周期为 3 年，4 年级、5 年级、6 年级的学生存在样本流失的问题，而 1 年级学生正值乳恒牙交替时期，不能保证每个样本都有恒牙萌出。故选择 3 年级学生。

144. 试验周期预计 3 年，采用指数标准为

A. DMFT

B. dmft

C. DMFS

D. dmfs

E. DEFT

答案：C

解析：恒牙龋失补指数（DMFT 和 DMFS）是检查龋病时最常用的指数，由于 DMFS 较 DMFT 更为敏感，对于易感人群的防制效果调查更为准确，因为调查时间为 3 年，而小学生正值更换乳牙时期，故乳牙不能作为调查对象，应采用恒牙的指标进行调查。

145. 试验对象用的学生年级是

A. 1 年级

146. (146-150 题共用题干) 李老师带领一组实习生到某市郊区县进行口腔健康调查，大家认真讨论了调查方案和步骤方法，就下面的各个环节提出了具体措施。在采用何种调查方法上，大家一致同意用

A. 普查

B. 抽样调查

C. 预调查

D. 捷径调查

E. 社会调查

答案：B

解析：





147.对于用哪个年龄组代表幼儿、学生和老年人，李老师的意见是采用 WHO 的标准

A.3 岁、10 岁和 70 岁

B.4 岁、9 岁和 65 岁

C.5 岁、12 岁和 65~74 岁

D.5 岁、15 岁和 60-65 岁

E.5 岁、18 岁和 65-74 岁

答案：C

解析：

148.学生的调查项目为口腔常见病和多发病

A.龋齿和牙髓炎

B.龋齿和牙周疾病

C.牙外伤和牙周病

D.龋齿和牙列不齐

E.牙外伤和龋齿

答案：B

解析：

149.调查指数和标准采用

A.DMFT 和 CPI

B.DMFS 和 CPI

C.DMFT 和 OHI-S

D.dmft 和 OHI-S

E.CPI 和 OHI-S

答案：A

解析：

150.需要了解人群口腔卫生知识和行为习惯，他们采取了

A.菌斑染色

B.识别保健牙刷

C.问卷调查

D.现场考试

E.个别提问

答案：C

解析：



更多医师考试资料



微信搜一搜



金英杰口腔学院