

内分泌（中级）

〔专业代码:309〕

1、男性患者，32岁，有十二指肠球部溃疡病史8年，一天前出现柏油便。检查：贫血。其贫血的类型为**正细胞正色素性贫血**

2、23岁女性，查体可见下肢散在直径3~5mm皮下出血区，应称为**紫癜**

3、内源性致热源存在于**单核细胞中**

4、患者，女性，24岁，1天前突起畏寒、发热，体温40℃，伴咳嗽、右侧胸痛，咳铁锈色痰。来院前自服APC1片。血压86 / 54mmHg(11.5 / 7.2kPa)，脉搏110 / min。右上胸语颤增强，可闻及支气管肺泡呼吸音，血WBC $26 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞90%。X线胸片示右上肺大片致密影，呈均匀大叶分布。最可能的诊断是**肺炎球菌肺炎伴循环衰竭**

5、患者，女性，50岁，一天来寒战、高热(体温39.6℃)，咳嗽伴左胸痛，咳痰呈砖红色胶冻状，量多，查体：**轻度发绀**，血压10.7 / 6.7kPa(80 / 50mmHg)，右肺叩浊音，呼吸音低。X线胸片右肺呈多发性蜂窝状阴影，最可能的诊断为**克雷伯杆菌肺炎**

6、患者，女，62岁，**慢性咳嗽3年**，乏力、痰中带血、体重减轻2个月。胸片右上肺可见一密度较高的圆形阴影，边缘不清。此病人的**右锁骨上窝浅表淋巴结最先出现肿大**

7、男性患者，56岁，平卧时频发胸痛，心率达110 / min，血压升高至165 / 95mmHg，并有左室舒张功能减退。首选**美托洛尔**治疗

8、男性患者，65岁，查体时发现大便隐血阳性，提示消化道出血量至少大于**5ml**

9、肝肿大伴扩张性搏动见于**三尖瓣关闭不全**

10、检查淋巴结肿大时，应优先注意弄清楚**原发病灶**

11、患者，女，58岁，夜间从**噩梦中**醒来，感胸骨后压榨性闷痛，伴呼吸困难，胸痛及呼吸困难持续不能缓解，患者出现面色苍白，冷汗淋漓，血压明显下降，皮肤发绀，此发绀属于**缺血性发绀**

12、女性患者，56岁，剧烈持续胸痛6小时入院。心电图示V1~6ST段明显上抬。双肺闻及湿性啰音，首选组合**吗啡，呋塞米(原称速尿)，多巴酚丁胺**进行治疗

13、呕吐宿食常见的原因是**幽门梗阻**

14、患者男，40岁，黄疸，肝脾肿大半年，进食时突然呕吐暗红色液体300ml，其病因可能为**食管静脉曲张破裂**

15、咯血伴皮肤黏膜出血，**肺癌并纵隔淋巴结侵犯**不常见

16、女性患者，16岁。晚餐进食一碗剩饭。1小时后出现上腹绞痛，并持续性恶心、呕吐。体温37.0度，**上腹部压痛**，肠鸣音活跃。白细胞总数正常、中性粒细胞占76%，便常规正常。诊断首先考虑是**急性胃炎**

17、咯血最常见的原因是**肺结核**

18、患者女，30岁，诉心悸胸闷。心尖区闻及收缩期杂音，经检查确诊为甲状腺功能亢进症，心脏无器质性病变，其心脏杂音应具有的特点是**性质柔和**

19、男性患者，21岁，突发中上腹刀割样剧烈疼痛30分钟。为持续性，腹痛迅速波及全腹。查体：腹部呈板状腹，压痛、反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能诊断是**胃、十二指肠穿孔**

20、女性患者，20岁，持续高热1周，胸、腹部出现皮疹，经检查确

诊为伤寒，其皮疹特征为呈粉红色丘疹

21、发绀的决定性因素是血液中还原血红蛋白的绝对量

22、意识障碍是指影响大脑功能活动的疾病引起的意识改变

23、大量咯血指的是每日咯血量在 500ml 以上

24、抢救大咯血窒息时最关键的措施是立即解除呼吸道梗阻

25、突发剧烈胸痛伴呼吸困难和发绀常见于肺梗死

26、患者女，44 岁，发热一天，右上腹痛，呕吐 4 次，体检示 Murphy 征阳性，经用抗生素治疗后退热，症状改善。该患者发生呕吐的机制可能为反射性呕吐

27、十二指肠球部出血可见柏油样便

28、中年男性，持续或间断痰中带血，首先需考虑的是肺癌

29、排便后，腹痛不减轻者，常为小肠疾病

30、男性患者，22 岁，晚餐后突然出现上中腹部疼痛并恶心呕吐胃内容物，随后出现发热，腹痛转移至右下腹。查体：体温 38℃，心肺无异常。右下腹麦氏点压痛。诊断考虑为急性阑尾炎

31、尿频的定义是排尿次数增多而每次尿量减少

32、体温 39℃ 以上，一昼夜温差大于 2℃，但最低点仍高于正常水平的体温曲线类型属于弛张热

33、潮式呼吸的特点为由浅慢到深快，再由深快到浅慢

34、患者，女，49 岁，突然出现头痛、视力模糊、呕吐、上腹痛、四肢痉挛、血压下降，身边有杀鼠药氟乙酰胺，治疗的特效药为乙酰胺

35、日咯血量是 100~500ml 时为中量

36、Dubin-Johnson 综合征属于肝细胞对某些阴离子排泄障碍

37、便血，血色鲜红，黏附于粪便表面，便纸上可见血迹，提示是肛门或肛管疾病出血

38、女性患者，47 岁，心慌胸闷 1 个月就诊，心脏听诊发现第二心音固定分裂，最常见的疾病是房间隔缺损

39、早期休克的表现为血压 11.97 / 9.31kPa (90 / 70mmHg)

40、尿痛指排尿时膀胱区及尿道疼痛或烧灼感

41、患者，女，38 岁。双下肢对称性紫癜。实验室检查：束臂试验 (+)，血块退缩良好，血小板计数正常，凝血时间 6min。患者诊断为过敏性紫癜

42、中年男子，反复上腹隐痛半年，多在空腹出现，有时夜间出现腹痛，进食后缓解，最可能的诊断是十二指肠溃疡

43、估计血容量最好的指标是中心静脉压

44、患者男，18 岁，心脏检查发现胸骨左缘第 1、2 肋间有连续性震颤，并可闻及机器样连续性杂音，考虑为动脉导管未闭

45、人体呕吐中枢位于延髓外侧网状结构背面

46、患者男，3 岁，在独自玩玩具时突然出现刺激性咳嗽，呼吸困难，其病因最可能是气管异物

47、男性患者，20 岁，咳嗽，气急，间断发热 2 个月，咳黄色黏痰，少量痰中带血，右锁骨上扪及 2 枚淋巴结，最可能的病因是肺结核

48、可出现周围性发绀的疾病是右心衰竭

49、腋测法测量体温的正常值为 36℃~37℃

50、旁路胆红素约占体内总胆红素来源的 15%~20%

51、急性细菌性痢疾的大便性状为黏液性脓性鲜血便

52、心源性水肿患者，常先出现水肿的部位是人体最低部位

53、食用过多含胡萝卜素的食物可使皮肤黄染，但一般不发生在巩膜

和口腔黏膜

54、血清胆红素正常值为 $<17 \mu\text{mol} / \text{L}$ ，即 1.0g / dl

55、胃酸分泌增多引起的腹泻是胃泌素瘤

56、常出现淋巴结坏死破溃形成瘰管的疾病是淋巴结结核

57、黄疸、畏寒、发热、右上腹绞痛伴呕血，最可能是胆道结石伴梗

阻

58、便血合并皮肤黄染、蜘蛛痣及肝掌，首先考虑是胃底食管静脉破

裂出血

59、呼吸深慢见于酸中毒

60、一患者呼吸表现为有规律的呼吸几次后，突然停止一段时间，又开始呼吸，周而复始，这种呼吸节律称为 Blots 呼吸

61、某患者，胸闷气急 1 个月，查体右胸廓较左侧塌陷，呼吸运动减弱，叩诊实音，语颤消失，呼吸音消失，气管及心脏右移，最可能的诊断为右侧支气管肺癌并肺不张

62、大气道阻塞时重者出现吸气时“三凹征”

63、乳头血性分泌物最常见于乳腺导管内良性乳突状瘤

64、呼吸过缓见于镇静剂过量

65、提示左心室衰竭的是交替脉

66、局限性淋巴结肿大见于 Virchow 淋巴结

67、青年男性，突发胸闷气急 1 天，感胸部不适，轻微咳嗽，系弯腰抬物后出现。1 个月前体检无异常。提示最可能的病因为自发性气胸

68、青年男性，突然发热，体温 39.1℃，面色潮红，伴有呼吸运动减弱，口角疱疹，最可能的病因为大叶性肺炎

69、面具面容见于震颤麻痹

70、一心房颤动患者，突觉呼吸困难咳嗽、胸痛，心脏听诊闻及三尖瓣区舒张期奔马律，其来源为右心室奔马律

71、毕奥呼吸常见于呼吸中枢功能障碍

72、急性呕吐伴上腹痛、发热、皮肤发黄，应考虑是急性胆囊炎合并胆道梗阻

73、Kernig 征检查属于脑膜刺激征

74、胸椎后突并成角畸形，常见于胸椎结核

75、可闻及心包摩擦音的疾病是急性心肌梗死

76、器质性二尖瓣狭窄的特点是常有心房颤动

77、右心衰竭引起呼吸困难的原因为淤血性肝肿大等使运动受限而减少肺交换面积

78、心悸伴食欲增加、消瘦、出汗最常见于甲状腺功能亢进

79、COPD 的主要病理改变正确的有腺体肥厚，与支气管壁的厚度比值常大于 0.85

80、主要为毛细血管壁缺陷的疾病是过敏性紫癜

81、惊厥前伴剧烈头痛，可见于蛛网膜下腔出血

82、患者男，28岁，间断咳血3年，本次因抬重物后突然出现咯血200ml。查体双下肺湿啰音，胸片检查双下肺纹理增多、粗乱，提示最可能的病因是**支气管扩张**

83、青年男性，有吸毒史，发热1周，体温最高40.3℃，最低38.2℃，偶有咳嗽，少量痰中带血。查体神志清楚，呼吸22次/分，血压110/70mmHg，心率110次/分，肘静脉处有多个针眼，上腹部轻压痛。血常规白细胞总数 $19.8 \times 10^9 / L$ ，中性粒细胞92%，此患者最优先进行的诊疗措施是**抽血做血培养**

84、砖红色冻胶样痰常见于**克雷伯杆菌肺炎**

85、男性患者，45岁，心悸、胸痛、劳力性呼吸困难1个月，查体胸骨左缘粗糙的喷射性收缩期杂音，超声心动图检测发现室间隔非对称性肥厚，最可能的诊断是**肥厚型梗阻性心肌病**

86、左心衰竭常表现为常采取**端坐呼吸体位**

87、保持镇定、作风严谨属于**手术治疗**中的道德要求

88、安全有效属于**药物治疗**中的道德要求

89、医疗机构从业人员分为**6**个类别

90、组织实施医师资格考试的部门是省级以上人民政府卫生行政部门

91、医师在进行实验性临床医疗时，应充分保障患者或其家属的知情同意权

92、对于轻度和中度AECOPD患者，主要致病菌为**肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌**

93、对MRSA引起的肺炎首选抗生素是**万古霉素**

94、支气管肺癌最常见的早期症状是阵发性、刺激性干咳

95、慢性支气管炎早期患者肺部 X 线表现是无特殊征象

96、按累及肺小叶的部位，阻塞性肺气肿的病理分型为全小叶型、小叶中央型、混合型

97、哮喘患者急性发作的治疗目的是缓解支气管平滑肌痉挛

98、最常见的肺炎类型是细菌性肺炎

99、慢性肺源性心脏病降低肺动脉高压的首选治疗是疗氧

100、支气管哮喘患者以呼气性呼吸困难为主

101、肺炎胸痛放射到上腹部时病变常累及膈胸膜

102、金黄色肺炎的 X 线阴影具有易变性，易形成单个或多发的液气囊腔

103、女性患者，30 岁。因重度哮喘急性发作住院治疗缓解，平时亦有哮鸣音存在。出院后最有效和推荐长期应用的抗炎剂是吸入糖皮质激素

104、男性，25 岁。10 天前左臀疖肿，前天开始发热伴寒战、咳嗽、咳脓痰，3 天来痰中带血，胸痛，血象：WBC $25 \times 10^9/L$ ，N91%，胸片示两肺有散在密度较淡的片状阴影，内有透光区及可疑气液平面。应考虑为金黄色葡萄球菌肺炎

105、慢性支气管炎诊断主要依据于病史和体征

106、慢性阻塞性肺疾病的主要特征是气流受限

107、胸水检查为：血性，比重 1.020，蛋白定量 39g/L，LDH503U/L，葡萄糖定量 2.4mmol/L，ADA50U/L，最可能的诊断为结核性胸水

108、吸烟者所患肺癌最常见的是鳞状细胞癌

109、慢性阻塞性肺气肿的主要症状为**逐渐加重的呼吸困难**

110、男性患者，30岁。近期**劳累**突发畏寒、高热。咳嗽，铁锈样痰。查体：体温高达39℃，干咳，伴右侧胸痛，咳嗽和深呼吸时加重；急性病容，颜面潮红，口角有疱疹，右下肺可闻及支气管呼吸音。临床诊断为急性肺炎，其最可能的病原体是**肺炎链球菌**

111、原发性高血压心脏并发症中首先出现的是**心肌肥厚**

112、左心衰竭时肺部啰音的特点**湿啰音**常见于**两肺底**，并随体位**变化而变化**

113、贫血与甲亢对心脏产生的影响使**左室、右室容量负荷加重**

114、对风湿性二尖瓣关闭不全，最具有诊断意义的体征是**心尖区收缩期吹风样杂音**

115、风湿性心脏瓣膜病二尖瓣狭窄的特征性体征是**心尖区舒张中晚期隆隆样杂音，递增型**

116、降压作用缓慢，适用于**轻中度高血压**，降压同时使心律减慢的药物是**美托洛尔**

117、主动脉瓣关闭不全，出现周围血管征的原因是**收缩压增高、舒张压下降**

118、治疗高血压危象最好采用**硝普钠**

119、洋地黄中毒多见的心律失常是**室性期前收缩二联律**

120、左心衰竭的临床表现主要是由于**肺淤血、肺水肿**所致

121、确诊慢性胃炎最可靠的检查方法是**活组织检查**

122、慢性消化性溃疡穿孔多见于**十二指肠球后壁溃疡**

123、出血坏死型胰腺炎时的 Cullen 征是指**脐周皮肤青紫**

124、诊断消化性溃疡急性穿孔最有价值的临床表现是**肝浊音区消失**

125、出血坏死性胰腺炎的特点是**血钙降低**

126、女性患者，74 岁，因关节炎关节酸痛，口服水杨酸制剂，既往无溃疡病史，4 小时前突然大量呕血，测 BP100/55mmHg，P115 次/分。则出血的原因是**急性胃黏膜病变**

127、伴有高血压的消化性溃疡患者不宜用**生胃酮**

128、肝硬化常见的死亡原因是**肝性脑病**

129、女性患者，既往十二指肠溃疡病史 10 年，着凉后上腹部疼痛，2 天前突然呕咖啡样胃内容物，排柏油样便，随后晕厥。估计出血量为 **1000ml 以上**

130、肝癌引起的肝区疼痛的特点是**持续性钝痛或胀痛**

131、急性胰腺炎时，可减轻腹痛的**体位是弯腰抱膝位**

132、患者，男性，50 岁。**反复上腹痛** 8 年，近 2 个月疼痛加重，五肽促胃液素刺激试验示**胃酸缺乏**。进一步的诊治方案首选**胃镜检查加活检**

133、慢性肾功能不全的贫血，最根本、最有效的方法是**肾移植**

134、中老年肾病综合征常见病理类型是**膜性肾病肾小球肾炎**

135、急性肾衰竭时，需紧急血液透析的是**急性肺水肿**

136、急性肾炎最主要的治疗措施是**休息及对症治疗**

137、妊娠期尿路感染禁用的抗生素是**左氧氟沙星**

138、女性患者，32 岁。既往体健，1 个月前出现双下肢水肿，进行性加重，实验室检查发现尿蛋白(+++)，血肌酐 $430 \mu\text{mol/L}$ 。为明确诊断，

首选的检查为肾脏彩超

139、肉眼血尿的患者，首先应该进行尿 RBC 畸形率检查

140、慢性肾衰竭的患者合并纤维囊性骨炎的直接因素是继发性甲状旁腺功能亢进

141、对诊断肾结核价值最大的是肾脏增强 CT

142、特发性血小板减少性紫癜的首选治疗方法为糖皮质激素

143、引起缺铁性贫血的主要原因是慢性失血

144、女性患者，26 岁。慢粒病史 2 年，近 1 周高热脾大平脐，血红蛋白 46g/L，白细胞 $30 \times 10^9 / L$ ，分类原粒占 40%，中晚幼粒占 40%，血小板 $40 \times 10^9 / L$ 。诊断为慢粒白血病急性变

145、缺铁性贫血在成年男性中最多见的原因是消化道慢性失血

146、ITP 出血状的特点为牙龈出血，鼻出血 皮肤瘀点、瘀斑多见

147、急性 ITP 死亡的主要原因是颅内出血

148、中枢神经系统白血病多见于 ALL

149、缺铁性贫血的细胞形态学特点是小细胞低色素性贫血

150、缺铁性贫血的预后取决于原发病是否能够治疗彻底