

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列各项,体现“证”的内在本质的是
 - 病位
 - 病性
 - 病势
 - 病因
 - 病机
- 下列各项,适用于“阴虚则热”的治疗原则是
 - 热者寒之
 - 阴病治阳
 - 阳病治阴
 - 阴中求阳
 - 寒者热之
- 下列哪条不适用于“阴中求阳”或“阳中求阴”的治疗方法
 - 阴虚
 - 阳虚
 - 阴阳偏胜
 - 阴阳偏衰
 - 阴阳两虚
- 扶土抑木法的理论基础是
 - 五行相生
 - 五行相克
 - 五行相乘
 - 五行相侮
 - 母病及子
- 根据五行相生规律所确定的治疗方法是
 - 扶土抑木
 - 佐金平木
 - 培土生金
 - 壮水之主,以制阳光
 - 泻南补北
- 可用阴阳互根互用解释的是
 - 寒极生热
 - 阴病治阳
 - 寒者热之
 - 重阴必阳
 - 阴中求阳
- 脾的阴阳属性是
 - 阴中之阴
 - 阴中之阳
 - 阴中之至阴
 - 阳中之阳
 - 阳中之阴
- 适合治疗阴偏衰的治法是
 - 阳病治阴
 - 阴病治阳
 - 阴中求阳
 - 阳病治阳
 - 阴病治阴
- 按五行属性分类,五化属水者是
 - 生
 - 长
 - 化
 - 收
 - 藏
- 五行中具有“从革”特性的是
 - 水

- B.火
 - C.木
 - D.金
 - E.土
- 11.五行学说认为病情较轻浅的脏病传变是
- A.肺病及肾
 - B.肺病及脾
 - C.肺病及肝
 - D.肝病及脾
 - E.心病及肝
- 12.具有“满而不能实”生理特点的是
- A.五脏
 - B.六腑
 - C.脏腑
 - D.奇恒之腑
 - E.以上都不是
- 13.五脏与五体关系中哪项说法不正确
- A.心在体合脉
 - B.肝在体合筋
 - C.肺在体合毛
 - D.脾在体合肉
 - E.肾在体合骨
- 14.脾为气血生化之源的理论基础是
- A.气能生血
 - B.人以水谷为本
 - C.脾主升清
 - D.脾主运化水谷精微
 - E.脾为后天之本
- 15.具有“喜燥恶湿”特点的脏腑为
- A.肝
 - B.心
 - C.脾
 - D.肺
 - E.肾
- 16.“七冲门”中,会厌的名称是
- A.飞门
 - B.户门
 - C.吸门

- D.贲门
 - E.幽门
- 17.称“受盛之官”的腑是
- A.胃
 - B.小肠
 - C.大肠
 - D.膀胱
 - E.三焦
- 18.“罢极之本”指的是
- A.肝
 - B.心
 - C.肺
 - D.脾
 - E.肾
- 19.气血关系指的是下述哪两脏之间的关系
- A.心与肺
 - B.心与脾
 - C.心与肝
 - D.心与肾
 - E.肺与肝
- 20.具有推动呼吸和血行功能的气是
- A.心气
 - B.肺气
 - C.营气
 - D.卫气
 - E.宗气
- 21.下列各项,不属肺生理特性的是
- A.肺为华盖
 - B.肺为娇脏
 - C.肺气宣发
 - D.肺气肃降
 - E.肺朝百脉
- 22.治疗血行瘀滞,多配用补气、行气药,是由于
- A.气能生血
 - B.气能行血
 - C.气能摄血
 - D.血能生气

- E.血能载气
- 23.“吐下之余定无完气”的理论依据为
- A.气能生津
B.气能行津
C.气能化津
D.气能摄津
E.津能载气
- 24.上肢内侧后缘分布的经脉是
- A.手太阴肺经
B.手阳明大肠经
C.手厥阴心包经
D.手少阳三焦经
E.手少阴心经
- 25.腹部经脉由外而内排列的顺序为
- A.足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳
B.足少阴、足阳明、足太阳、足太阴
C.足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴
D.足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
E.足厥阴、足太阴、足阳明、足少阴
- 26.六淫邪气中纯属外邪的是
- A.风
B.寒
C.暑
D.湿
E.火
- 27.湿邪致病,缠绵难愈是因为
- A.湿为阴邪,易阻遏气机
B.湿为阴邪,伤人阳气
C.湿性重浊,不易祛除
D.湿性黏滞,不易祛除
E.湿性趋下,为病缠绵
- 28.诊断疾病时以气息分阴阳,属阳者为
- A.语声低微
B.语声无力
C.少言沉静
D.语声高亢
E.低声懒言
- 29.七情致病影响脏腑气机,下述哪项是错误的
- A.怒则气上
B.喜则气缓
C.悲则气消
D.思则气结
E.恐则气乱
- 30.饮食五味失宜,引起“脉凝泣而变色”的是
- A.多食咸
B.多食酸
C.多食苦
D.多食甘
E.多食辛
- 31.六腑“以通为用,以降为顺”的理论基础是
- A.六腑既是受盛水谷又是传化糟粕的器官
B.六腑的形体特点为空腔器官
C.六腑都是接受饮食物的受盛器官
D.六腑都是贮藏精气的器官
E.六腑既不是受盛水谷又不是传化糟粕的器官
- 32.足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉,变换前中位置,是在
- A.外踝上8寸处
B.内踝上2寸处
C.内踝上3寸处
D.内踝上5寸处
E.内踝上8寸处
- 33.导致“至虚有盛候”的病机主要是
- A.正气不足,抗病能力减退,邪气亢盛
B.脏腑气血虚极,运化无力,外现实象
C.阴精和阳气衰竭,外邪侵袭
D.脏腑功能减退,饮食积聚
E.内生五邪之病理反映
- 34.阳偏衰的病机,主要是指
- A.阳气虚损,功能减退,热量不足
B.阳虚则气衰,阴寒之邪内盛
C.阴邪侵袭,伤及阳气,阴盛阳衰
D.阳气虚亏,导致精血津液不足

- E.阴寒内盛,遏抑阳气,阳气不伸
- 35.以调节气机升降为主要关系的两脏为
- A.肺与脾
 - B.肺与肝
 - C.肺与肾
 - D.肺与心
 - E.肝与脾
- 36.下列各组药物中,属于配伍禁忌的是
- A.巴豆与牵牛
 - B.丁香与三棱
 - C.牙硝与郁金
 - D.官桂与五灵脂
 - E.人参与石脂
- 37.七情配伍中,可以降低药物功效的配伍是
- A.相须
 - B.相使
 - C.相杀
 - D.相畏
 - E.相恶
- 38.治疗筋脉挛急疼痛的药物,大多是何种药味
- A.酸
 - B.苦
 - C.甘
 - D.辛
 - E.咸
- 39.既能疏散风热,又能息风止痉的药物是
- A.薄荷
 - B.蝉蜕
 - C.桑叶
 - D.菊花
 - E.牛蒡子
- 40.柴胡与升麻均具有的功效是
- A.解表生津
 - B.清热解毒
 - C.疏肝解郁
 - D.升举阳气

- E.透发麻疹
- 41.芦根、淡竹叶的共同功效,除清热除烦外,还有
- A.利尿
 - B.止呕
 - C.生津
 - D.排脓
 - E.凉血
- 42.升麻与菊花具有的共同功效是
- A.透疹
 - B.解毒
 - C.消疮
 - D.止血
 - E.平肝
- 43.具有清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮功效的药物是
- A.白薇
 - B.青蒿
 - C.胡黄连
 - D.牡丹皮
 - E.黄柏
- 44.芒硝的功效是
- A.软坚泻下
 - B.泻下攻积
 - C.养血润肠
 - D.养阴通便
 - E.壮阳通便
- 45.既能祛风除湿,又可治骨鲠的药物是
- A.羌活
 - B.独活
 - C.威灵仙
 - D.秦艽
 - E.木瓜
- 46.既能燥湿健脾,又可发汗解表的药物是
- A.白术
 - B.苍术
 - C.香薷
 - D.藿香

- E.佩兰
- 47.砂仁的功效是
- A.补气安胎
B.清热安胎
C.理气安胎
D.补肝肾安胎
E.止血安胎
- 48.治疗尿赤心烦、口舌生疮者,宜选用的药物是
- A.车前子
B.泽泻
C.茯苓
D.木通
E.猪苓
- 49.既能温中回阳,又可温肺化饮的药物是
- A.生姜
B.干姜
C.肉桂
D.花椒
E.丁香
- 50.善治厥阴头痛的药物是
- A.藁本
B.白芷
C.吴茱萸
D.细辛
E.蔓荆子
- 51.黄芩除能清热燥湿,泻火解毒,止血外,还具有的功效是
- A.安胎
B.杀虫
C.利尿
D.除烦
E.止呕
- 52.既能补火助阳,又能引火归原的药物是
- A.吴茱萸
B.肉桂
C.高良姜
- D.丁香
E.附子
- 53.牛膝不具有以下哪种功效
- A.活血祛瘀
B.祛风湿
C.强筋骨
D.利尿通淋
E.引血下行
- 54.治疗久咳虚喘之证,宜选用的药物是
- A.桑白皮
B.葶苈子
C.白果
D.莱菔子
E.马兜铃
- 55.下列忌火锻的药物是
- A.牡蛎
B.珍珠
C.朱砂
D.磁石
E.龙骨
- 56.地龙与麻黄的共同功效是
- A.散寒,除痹
B.解表,通络
C.平喘,利尿
D.通窍,解毒
E.息风,止痛
- 57.石菖蒲与远志的共同作用是
- A.开窍宁神
B.化湿和胃
C.养心安神
D.祛痰止咳
E.消痈散肿
- 58.钩藤入煎剂的正确用法是
- A.冲服
B.包煎
C.先煎
D.不宜久煎
E.另煎
- 59.具有利气散结,通络止痛功效的药物是

- A.川贝母
B.天南星
C.白芥子
D.天竺黄
E.桑白皮
- 60.治疗血瘀经闭,癥瘕应选用的药物是
A.酸枣仁
B.石菖蒲
C.僵蚕
D.麝香
E.冰片
- 61.幽门梗阻腹部听诊特点
A.麦氏点压痛阳性
B.墨菲征阳性
C.液波震颤阳性
D.振水音阳性
E.移动性浊音阳性
- 62.鉴别结核性胸膜炎与恶性胸腔积液的主要指标是
A.是否为血性胸腔积液
B.肺内有无结核病灶
C.胸腔积液细胞学和细菌学检查
D.胸腔积液增长速度
E.全身中毒症状的轻重
- 63.下列哪种情况心排量不增加
A.甲状腺功能亢进
B.维生素 B 缺乏症
C.动静脉瘘
D.贫血
E.二尖瓣关闭不全
- 64.哪一种药物最常应用于治疗冠心病变异型心绞痛发作
A.硝酸酯类
B.β受体阻断剂
C.洋地黄类
D.钙离子通道阻断剂
E.胺碘酮
- 65.判断幽门螺杆菌(Hp)是否根除的临床检验方法应除外
A.组织学检查找 Hp
B.活组织细菌培养
C.¹⁴C 尿素呼吸试验
D.活组织快速尿素酶试验
E.血清抗 Hp 抗体测定
- 66.原发性肝癌肝内转移最常见的途径是
A.肝动脉
B.肝静脉
C.淋巴管
D.胆管系
E.肝门静脉
- 67.急性腹痛 1 周后,哪项检查对胰腺炎诊断较有价值
A.白细胞计数及分类
B.血清淀粉酶
C.血清脂肪酶
D.空腹血糖测定
E.X 线腹部平片
- 68.胃癌血行转移,首先转移到
A.肝脏
B.肺脏
C.骨骼
D.脑部
E.卵巢
- 69.哪种临床表现对诊断急性肾炎最有意义
A.水肿
B.血尿
C.高血压
D.尿比重减低
E.中等量以上的蛋白尿
- 70.哪些部位受刺激可产生尿路刺激征
A.尿道
B.输尿管
C.膀胱后壁+膀胱颈
D.膀胱前壁+膀胱颈
E.膀胱三角区、膀胱颈
- 71.巨大脾脏常见于
A.急性粒细胞白血病

- B.慢性粒细胞白血病
C.急性淋巴细胞白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
E.肝硬化脾功能亢进
- 72.急性胰腺炎属于
A.感染性疾病
B.遗传性疾病
C.自身消化性疾病
D.免疫性疾病
E.结缔组织疾病
- 73.糖尿病酮症时酮体阳性指哪项
A.生酮氨基酸
B. β -羟丁酸
C.丙酮酸
D.乙酰乙酸、丙酮酸、 β -羟丁酸
E.乙酰乙酸、 β -羟丁酸
- 74.下列哪项不属于类风湿关节炎的关节外表现
A.腋窝囊肿
B.发热
C.皮下结节
D.贫血
E.心包炎
- 75.糖皮质激素治疗系统性红斑狼疮的作用机制是
A.抗休克
B.控制炎症、抑制免疫反应
C.控制感染
D.抗过敏
E.抗内毒素
- 76.何时做头部 CT 检查诊断脑梗死阳性率较高
A.发病 6 小时以后
B.发病 12 小时以后
C.发病 48 小时以后
D.发病 18 小时以后
E.发病 1 周以后
- 77.脑出血的预后与哪种因素有关
A.出血量
B.并发症严重程度
C.出血部位
D.出血量和部位
E.出血量、部位及并发症严重程度
- 78.有机磷中毒毒蕈碱样症状的主要表现是
A.腺体分泌减退,平滑肌松弛
B.腺体分泌亢进,平滑肌痉挛
C.腺体分泌减退,平滑肌痉挛
D.腺体分泌亢进,运动神经兴奋
E.运动神经兴奋,平滑肌痉挛
- 79.有机磷农药中毒出现呼吸肌瘫痪时应用哪种药物
A.新斯的明
B.琥珀酰胆碱
C.阿托品
D.可拉明
E.解磷定
- 80.治疗急性一氧化碳中毒,先用哪种方法
A.20%甘露醇 250 mL 静脉快速滴注
B.ATP 注射
C.冬眠疗法
D.氧气疗法
E.血液透析
- 81.《中华人民共和国执业医师法》所称医师包括
A.主治医师和主任医师
B.主治医师和住院医师
C.医师和助理医师
D.副主任医师和主任医师
E.执业医师和执业助理医师
- 82.按照《麻醉药品和精神药品管理条例》规定:医生开具的急诊处方一般不得超过
A.5 日
B.7 日
C.3 日
D.1 日

- E.2 日
- 83.属于行政处分的是
- A.降职
B.罚款
C.责令停产
D.没收违法所得
E.吊销卫生许可证
- 84.未经医师注册取得执业证书的
- A.不得从事医师执业活动
B.可在预防机构从事医师执业活动
C.可在保健机构从事医师执业活动
D.可在执业医师指导下,在预防、保健机构从事医师执业活动
E.可在执业医师指导下从事医师执业活动
- 85.医师注册后有列情形之一的应当注销注册,除了
- A.死亡的
B.被宣告失踪的
C.承担民事责任的
D.受吊销医师执业证书行政处罚的
E.中止医师执业活动满二年的
- 86.医师考核不合格者,县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动
- A.一至两个月
B.一至三个月
C.三至六个月
D.六至十二个月
E.十二个月以上
- 87.在传染病的预防工作中,国家实行的制度是
- A.有计划的卫生防疫
B.爱国卫生运动
C.预防保健
D.有计划的预防接种
E.以上都不是
- 88.某医生在门诊值班时发现一霍乱患者,必须在哪一个规定时限内报告
- A.城镇于 12 小时内,农村于 24 小时内
B.城镇于 6 小时内,农村于 12 小时内
C.城镇于 6 小时内,农村于 24 小时内
D.城镇于 12 小时内,农村于 12 小时内
E.城镇于 12 小时内,农村于 36 小时内
- 89.下列除了哪项以外,均属于医疗事故
- A.急性阑尾炎行阑尾切除术,术后一年发现腹腔残留纱布
B.行阑尾切除术,误切右侧卵巢
C.值班医师外出,一危重病人突发病情变化,40 分钟后病人死亡
D.给“B”型血病人输“A”型血
E.病人无药物过敏史,服用医师开具的药物后出现过敏性休克,经积极抢救无效死亡
- 90.对待患者知情同意权的做法中,错误的是
- A.婴幼儿可以由监护人决定
B.对某些特殊急诊抢救视为例外
C.无家属承诺,即使患者本人知情同意也不能给予手术治疗
D.做到充分知情
E.做到有效同意

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 91.患者呕吐吞酸,暖气频繁,胸胁闷痛,脉弦。治疗应选用的药物是

- A.干姜
- B.高良姜
- C.吴茱萸
- D.丁香
- E.小茴香

92.患者,女,65岁。心悸、胸闷、水肿十余年,近日病情加重,全身冷汗淋漓,神志时清时昏,面色苍白,手足冰凉,舌质淡胖,脉细微无力,应急用人参配伍的药物是

- A.白术
- B.党参
- C.附子
- D.黄芪
- E.甘草

93.患者,女,32岁。寒热往来,胸胁苦满,口苦咽干,治疗宜选下列何组药物配伍

- A.柴胡配槟榔
- B.柴胡配白芍
- C.柴胡配黄芩
- D.柴胡配葛根
- E.柴胡配枳实

94.患者,热结阴伤、大便燥结,宜用大黄配伍的药物是

- A.生地、玄参
- B.芒硝、甘草
- C.附子、干姜
- D.人参、当归
- E.厚朴、枳实

95.患者,女,74岁。近来脘腹胀满,不思饮食,四肢乏力,心悸失眠,且常见下肢水肿,舌体胖大,边有齿痕,舌苔白薄,脉象虚弱。最佳选药是

- A.白术
- B.苍术
- C.茯苓
- D.厚朴
- E.陈皮

96.患者,男,89岁。久病卧床,近日来冷汗自出,四肢厥逆,面色苍白。检查:血压

60/35 mmHg,听诊心音微弱。舌淡苔白,脉微欲绝。最佳选药是

- A.肉桂
- B.小茴香
- C.附子
- D.细辛
- E.吴茱萸

97.某男,49岁。近来每见小便开始或末尾尿液混浊,色如米泔,且常伴有小便不畅症状。西医诊断为“前列腺炎”。舌质淡,苔薄白,脉象弦滑。最佳选药是

- A.木通
- B.茯苓
- C.萆薢
- D.车前子
- E.泽泻

98.患者,男,28岁。一周前外感表证,引起咳嗽,现无恶寒发热,但咳嗽明显,痰黄稠难咯,胸闷,大便干,小便黄,舌红苔黄腻,脉滑略数。治疗宜首选的药物是

- A.全瓜蒌、浙贝母、芦根
- B.半夏、麻黄、五味子
- C.桔梗、马勃、马兜铃
- D.川贝、杏仁、白果
- E.桑叶、杏仁、百部

99.患者,女,30岁。带下量多,色黄而稠,少腹隐痛,阴部瘙痒,舌苔黄腻,脉滑数,用药首选

- A.清热泻火药
- B.清热凉血药
- C.清热燥湿药
- D.清热解毒药
- E.利水渗湿药

100.患者,肝经风热所致的目赤肿痛,羞明流泪,眵多色黄,首选桑叶、菊花配伍的药物是

- A.决明子
- B.石决明
- C.钩藤

D.天麻

E.地龙

101.患者,男,50岁。素体肥胖,胸闷憋气,时感胸痛,甚则胸痛彻背,舌质紫暗,苔薄腻,脉弦滑。治疗应首选的药物是

A.青皮

B.乌药

C.薤白

D.木香

E.香附

102.患者痰壅气逆,咳嗽喘逆,痰多胸闷,食少难消,舌苔白腻,脉滑。治疗宜选用的药物是

A.山楂

B.莱菔子

C.神曲

D.鸡内金

E.麦芽

103.患者,男,18岁。手足心热,夜眠多梦,时有遗精,舌质红,脉细数,治疗应首选的药物是

A.黄芩、黄连

B.黄连、黄柏

C.黄芩、黄柏

D.白果、莲子

E.黄柏、知母

104.患者,女,30岁。产后5天,右侧乳房红肿胀痛,触摸到硬块,大便如常,小便色黄。治疗应首选的药物是

A.大青叶

B.蒲公英

C.淡竹叶

D.栀子

E.知母

105.患者,女,28岁。妊娠3个月,腰痛如折,小腹下坠。治疗首选用药是

A.川牛膝

B.杜仲

C.五加皮

D.肉苁蓉

E.独活

106.患者,女,32岁。因旅途劳累而畏寒,高热,体温达39℃,干咳,右侧胸痛,深呼吸或咳嗽时加重。体检患者呈急性重病容,面部充血,口角有疱疹,右中下肺闻及支气管呼吸音,临床诊断急性肺炎。其最可能的病原体是

A.肺炎支原体

B.肺炎克雷伯杆菌

C.肺炎链球菌

D.肺炎衣原体

E.金黄色葡萄球菌

107.患者,女,55岁。头昏7年,血压180/100 mmHg,心率73次/分。心电图示一度房室传导阻滞。治疗宜选用

A.地尔硫草

B.维拉帕米

C.美托洛尔

D.卡托普利

E.普萘洛尔

108.患者,女,26岁。活动后心悸、气促4年,偶感心前区疼痛。血压140/45 mmHg,心界向左下扩大,胸骨左缘第3肋间闻及舒张期叹气样杂音,其最可能的疾病为

A.冠心病心绞痛

B.动脉导管未闭

C.心肌炎

D.风心病,主动脉瓣关闭不全

E.肥厚梗阻型心肌病

109.患者,女,35岁。慢性腹泻4年,大便每天4~5次,常带少量脓血,大便培养阴性。纤维结肠镜检见乙状结肠、直肠黏膜充血,少数散在浅溃疡。首选治疗药物是

A.柳氮磺胺吡啶

B.诺氟沙星

C.泼尼松

D.氢化可的松保留灌肠

E.甲硝唑保留灌肠

110.患者,女,21岁。近年来头昏、乏力、腰痛,下肢凹陷性水肿,尿蛋白(++++) ,红细胞0~1/Hp,血浆白蛋白22 g/L,胆固醇>8 mmol/L,血尿素氮及肌酐正常。拟诊应考虑

- A.急进性肾炎
- B.急性肾小球肾炎
- C.慢性肾小球肾炎
- D.紫癜性肾炎
- E.肾病综合征

111.患者,女,46岁。既往有泌尿系统感染史,中段尿培养阳性。1周来尿频、尿急、腰酸。尿常规:蛋白280 mg/L,红细胞0~1/Hp,白细胞(+)/Hp,尿亚硝酸盐还原试验阳性,提示尿中有

- A.结核杆菌
- B.粪链球菌
- C.白色念珠菌
- D.大肠杆菌
- E.淋球菌

112.患者,女,24岁。头晕、乏力半年,近2年每次月经经期持续7~8天,有血块。红细胞数 $3.0 \times 10^{12}/L$,血红蛋白65 g/L,血清铁蛋白10 mg/L,血清叶酸16 ng/mL,维生素 B_{12} 600 pg/mL,网织红细胞0.015,最可能的诊断是

- A.营养性巨幼红细胞性贫血
- B.缺铁性贫血
- C.溶血性贫血
- D.再生障碍性贫血

E.海洋性贫血

113.患者,女,27岁。1个月前产一女婴,2周前渐感颈前部疼痛,自觉吞咽时疼痛,无多汗、食欲差,甲状腺不大,右侧甲状腺区有一个1.0 cm×0.5 cm的结节,触痛。哪项试验用于确诊效果最好

- A. T_3 抑制试验
- B.TRH兴奋试验
- C.TSAB测定
- D.肺部CT检查
- E.甲状腺摄 ^{131}I 率测定+ TT_3 、 TT_4 测定

114.患者,20岁。糖尿病,呕吐,不能进食伴腹泻1天,昏迷,呼吸深大,血糖27.7 mmol/L,血钠140 mmol/L,血pH 7.2,对此患者首先应考虑

- A.低血糖
- B.高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- C.酮症酸中毒
- D.乳酸性酸中毒
- E.水中毒

115.患者,男,68岁。原发性高血压史20年,近日突然意识丧失,深度昏迷,出现“三偏征”,伴有高热与呕血。应首先考虑的是

- A.内囊-基底节出血(外侧型)
- B.内囊-基底节出血(内侧型)
- C.脑桥出血
- D.小脑出血
- E.蛛网膜下腔出血

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(116~117题共用备选答案)

A.木

B.水

C.金

- D.火
E.土
- 116.木的“所不胜”之“子”是
117.木的“母”之“所胜”是
(118~119 题共用备选答案)
- A.肾
B.脾
C.胃
D.肝
E.肺
- 118.“阴阳之根本”是指
119.“贮痰之器”是指
(120~121 题共用备选答案)
- A.肝病及心
B.肝病及肾
C.肝病及肺
D.肝病及脾
E.脾病及心
- 120.属五行相乘传变的是
121.属五行相侮传变的是
(122~123 题共用备选答案)
- A.正胜邪退
B.邪去正虚
C.邪盛正虚
D.邪正相持
E.正虚邪恋
- 122.疾病处于迁延状态,多由哪种病理过程所导致
- 123.疾病转为慢性,经久不愈,或遗留某些后遗症,多由哪种病理过程所导致
(124~125 题共用备选答案)
- A.阴盛则内寒
B.阳虚则外寒
C.阴盛则阳病
D.阳虚则阴寒内盛
E.阴盛格阳
- 124.寒湿内袭脾胃,而引起的脘腹冷痛,泄泻清稀,称为
- 125.阴寒内盛,迫阳外越而见面红、烦

- 渴,此属
(126~128 题共用备选答案)
- A.急则治标
B.缓则治本
C.逆治
D.从治
E.扶正
- 126.正气不足的治则为
127.寒病见寒象,应用
128.寒病见热象,应用
(129~130 题共用备选答案)
- A.用寒远寒
B.热者寒之
C.寒因寒用
D.寒者热之
E.同病异治
- 129.体现因时制宜的是
130.体现因人制宜的是
(131~132 题共用备选答案)
- A.蒲黄
B.白及
C.茜草
D.白茅根
E.三七
- 131.既能凉血止血,又能活血祛瘀的药物是
132.既能化瘀止血,又能利尿通淋的药物是
(133~134 题共用备选答案)
- A.消食健胃,和中止泻
B.消食化积,化痰除痞
C.消食和中,回乳消胀
D.消食化积,降气化痰
E.消食健胃,清热解毒
- 133.莱菔子的功效是
134.麦芽的功效是
(135~136 题共用备选答案)
- A.半夏
B.瓜蒌

- C.白芥子
D.川贝母
E.桔梗
- 135.痰湿咳嗽,宜选用的药物是
136.肺痈吐脓,排脓宜选用的药物是
(137~138题共用备选答案)
- A.陈皮
B.青皮
C.香附
D.沉香
E.薤白
- 137.善行脾胃气滞的药物是
138.善疏肝胆气滞的药物是
(139~140题共用备选答案)
- A.乳痈
B.肠痈
C.肺痈
D.疔毒
E.大头瘟毒
- 139.紫花地丁善于治疗的病证是
140.鱼腥草善于治疗的病证是
(141~142题共用备选答案)
- A.左室舒张期过短
B.左室排血量急剧下降
C.左室舒张期负荷突然明显加重
D.左室充盈障碍
E.左室后负荷突然明显加重
- 141.二尖瓣狭窄伴快速房颤
142.急性广泛心肌梗死
(143~144题共用备选答案)
- A.水肿、血尿、高血压
B.发作性肉眼血尿、无水肿及高血压
C.水肿、蛋白尿、高脂血症、低白蛋白

- 血症
D.水肿、蛋白尿、血尿、高血压、低蛋白血症
E.蛋白尿、血尿、高血压、肾功能损害
- 143.肾病综合征的表现是
144.慢性肾小球肾炎的表现是
(145~146题共用备选答案)
- A.急性粒细胞白血病
B.急性淋巴细胞白血病
C.慢性粒细胞白血病
D.慢性淋巴细胞白血病
E.慢性再生障碍性贫血
- 145.VP方案常用于治疗
146.HOAP方案常用于治疗
(147~148题共用题干)
- A.ANA
B.抗Sm抗体
C.抗RNP抗体
D.抗dsDNA抗体
E.抗PCNA抗体
- 147.对系统性红斑狼疮诊断特异性最强的抗体是
148.与系统性红斑狼疮活动性相关的抗体是
(149~150题共用备选答案)
- A.深昏迷,口唇呈樱桃红色
B.瞳孔缩小,出汗流涎
C.瞳孔扩大,谵妄幻觉
D.深昏迷,瞳孔时大时小
E.昏迷伴肌纤维颤动
- 149.阿托品中毒
150.一氧化碳中毒

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	C	C	C	C	E	C	A	E	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	C	D	C	C	B	A	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	B	E	E	E	C	D	D	E	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	E	B	A	B	A	E	C	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	A	A	C	B	C	D	B	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	B	B	C	C	C	A	D	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	C	E	D	E	E	C	A	B	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	C	D	A	B	C	E	B	E	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	C	A	A	C	C	D	B	E	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	C	C	A	C	C	C	A	C	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	B	E	B	B	C	D	D	A	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	E	C	B	B	D	A	E	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	D	E	C	E	E	C	D	A	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	A	D	C	A	E	A	B	D	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
D	B	C	D	B	A	B	D	C	A

第二单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列各项,属于中医诊断基本原则的是
- A. 望闻问切
B. 司外揣内
C. 辨病论治
D. 辨证论治
E. 整体审察
2. 病人言语失伦,瞳神呆滞,面色晦暗,反应迟钝属于
- A. 假神
B. 精神异常
C. 失神
D. 神气不足
E. 无神
3. 根据《灵枢·五色》的分法,整个面部称为“阙”的部分是
- A. 额
B. 颊侧
C. 眉间
D. 耳门
E. 鼻
4. 下列各项,不是精亏神衰失神表现的是
- A. 神昏谵语
B. 呼吸气微
C. 肌肉瘦削
D. 动作艰难
E. 面色无华
5. 下列各项不属于邪盛神乱失神表现的是
- A. 循衣摸床
B. 撮空理线
C. 高热神昏
D. 呼吸气微
E. 两手握固
6. 青壮年头发稀疏易落者,多属
- A. 精血不足
B. 肾虚或血热
C. 血虚受风
D. 疝积
E. 脾胃虚损
7. 舌淡胖嫩而见苔滑润者,其主病为
- A. 湿热不化
B. 痰湿内停
C. 内有食积
D. 阳虚水湿不化
E. 脾虚运化无权
8. 观察舌苔以辨别病邪深浅的主要依据是
- A. 舌苔的有无
B. 苔色的黄白
C. 舌苔的有根无根
D. 舌苔的厚薄
E. 舌苔的润燥
9. 胃热病人的口气多为
- A. 腥气
B. 酸气
C. 臭秽气

- D.恶臭气
E.腐臭气
- 10.暖气酸腐的原因为
A.龋齿
B.宿食不化
C.中焦湿热
D.脾胃虚弱
E.胃寒
- 11.神识不清,语无伦次,声高有力,称为
A.谵语
B.郑声
C.独语
D.错语
E.夺气
- 12.多食易饥,兼见大便溏泻者属
A.脾胃湿热
B.胃阴不足
C.胃火亢盛
D.胃强脾弱
E.湿邪困脾
- 13.午后热甚,身热不扬者属
A.阴虚潮热
B.湿温潮热
C.小儿疰夏
D.阳明潮热
E.气虚发热
- 14.头痛晕沉,腹泻自汗者,属于
A.少阴经
B.太阴经
C.厥阴经
D.阳明经
E.少阳经
- 15.口甜而黏腻者,常提示
A.脾虚湿阻
B.痰饮内停
C.饮食停滞
D.肝胆湿热
E.脾胃湿热
- 16.左少腹作痛,按之累累有硬块者为

- A.虫积
B.肠痈
C.肠中有宿粪
D.癥积
E.痞满
- 17.弱脉与濡脉的共同特征是
A.沉而无力
B.浮而无力
C.脉来空虚无力
D.细而无力
E.迟而无力
- 18.下列除哪项外,均有脉率快的特点
A.数
B.促
C.滑
D.疾
E.动
- 19.具备沉、实、大、弦、长形象特点的脉是
A.牢脉
B.紧脉
C.芤脉
D.伏脉
E.革脉
- 20.“有根”的脉象是指
A.不浮不沉
B.节律一致
C.不快不慢
D.和缓有力
E.尺部沉取应指有力
- 21.前胸高起,按之气喘者为
A.肺胀
B.悬饮
C.支饮
D.痰饮
E.肺痈
- 22.表证和里证的主要鉴别要点是
A.腹泻与便秘
B.头痛与腹痛

- C.口渴与不渴
D.有汗与无汗
E.“寒热同时出现”与“单纯发热或畏寒”
- 23.心血虚与心阴虚的共有症状是
A.胸闷气短
B.头晕目眩,面白无华
C.五心烦热,潮热盗汗
D.心悸怔忡,失眠多梦
E.唇舌淡白,脉细数
- 24.合病是指
A.一经之病治不彻底,又见他经证候
B.互为表里经相传
C.这一经的证候转变为另一经的证候
D.两经或三经同时发病
E.隔一经或隔二经相传
- 25.头痛连齿者,病在
A.太阳经
B.少阴经
C.阳明经
D.厥阴经
E.少阳经
- 26.属于反佐药功用范畴的是
A.减君臣药之毒
B.缓和君臣药之峻
C.监制君臣药之偏
D.防止病重邪甚拒药
E.助君臣药之力
- 27.不宜使用下法治疗的是
A.燥屎内结
B.停痰留饮
C.瘀血积水
D.宿食积滞
E.痞块癥瘕
- 28.下列各项中对小青龙汤方药配伍意义的分析欠妥的是
A.干姜温肺化饮
B.半夏燥湿化痰
C.五味子敛肺气

- D.白芍和营养血
E.细辛散寒止痛
- 29.败毒散中配伍少量人参的意义是
A.益气补虚
B.益气固表
C.扶正祛邪
D.补气生津
E.以上都不是
- 30.主治证中以“皮肤蒸热”为特征的方剂为
A.麻杏石甘汤
B.清营汤
C.银翘散
D.泻白散
E.青蒿鳖甲汤
- 31.玉女煎中具有“引火下行”作用的药味是
A.熟地
B.石膏
C.知母
D.麦冬
E.牛膝
- 32.下列方剂中不含梔子的是
A.茵陈蒿汤
B.八正散
C.凉膈散
D.龙胆泻肝汤
E.仙方活命饮
- 33.清营汤中具有“透热转气”作用的主要药味是指
A.犀角与地黄
B.地黄与丹参
C.银花与连翘
D.黄连与麦冬
E.元参与竹叶
- 34.以“辛开苦降、寒热并用”为配伍特征的方剂是
A.麻黄汤
B.四逆散

- C.半夏泻心汤
D.苓桂术甘汤
E.苏子降气汤
- 35.功用为攻下通便,补气养血的方剂是
A.温脾汤
B.黄龙汤
C.济川煎
D.十枣汤
E.麻子仁丸
- 36.麻子仁丸的组成中不含
A.枳实
B.厚朴
C.大黄
D.芒硝
E.芍药
- 37.小建中汤中配伍芍药的意义是
A.益阴养血,柔肝缓急
B.养阴复脉,柔肝缓急
C.益气养阴,缓急止痛
D.益气养血,复脉定悸
E.养阴补血,活血通脉
- 38.由生附子、干姜、甘草组成的方剂名为
A.四逆散
B.温脾汤
C.理中汤
D.四逆汤
E.附子汤
- 39.理中丸除温中散寒外,还具有的功用是
A.和中缓急
B.降逆止呕
C.降逆止痛
D.养血通脉
E.补气健脾
- 40.制方中蕴含“培土生金”原理的方剂是
A.八珍汤
B.补中益气汤
C.肾气丸
D.参苓白术散
E.咳血方
- 41.当归补血汤原方中,当归与黄芪的配伍用量比例是
A.1:1
B.1:5
C.1:2
D.2:1
E.5:1
- 42.补阳还五汤重用黄芪为君的意义在于
A.益气固表
B.益气补血
C.补气活血
D.益气固脱
E.健脾利水
- 43.具有补气生血功用的方剂是
A.四君子汤
B.参苓白术散
C.当归补血汤
D.补中益气汤
E.生脉散
- 44.左归丸与一贯煎相同的功用是
A.滋阴
B.疏肝
C.补脾
D.降火
E.养血
- 45.血府逐瘀汤的组成中不含
A.桃仁、红花、川芎
B.当归、生地、甘草
C.柴胡、赤芍、牛膝
D.桔梗、枳壳
E.香附、丹皮
- 46.玉屏风散与牡蛎散相同的功用是
A.固表
B.涩肠
C.止遗

- D.固冲
E.补肾
- 47.具有缓消癥块功用的方剂是
A.复元活血汤与桃核承气汤
B.桃核承气汤与血府逐瘀汤
C.血府逐瘀汤与桂枝茯苓丸
D.桂枝茯苓丸与鳖甲煎丸
E.鳖甲煎丸与一贯煎
- 48.保和丸不宜用于
A.饮食停滞的胃脘痛
B.饮食停滞的泄泻
C.饮食停滞的恶心呕吐
D.脾虚食滞的脘痞不食
E.饮食不节的噎腐厌食
- 49.三仁汤中的“三仁”是指
A.杏仁、桃仁、郁李仁
B.火麻仁、杏仁、桃仁
C.杏仁、薏苡仁、薏苡仁
D.桃仁、冬瓜仁、薏苡仁
E.松子仁、柏子仁、胡麻仁
- 50.具有“温化痰饮”功用的方剂是
A.苓桂术甘汤
B.二陈汤
C.温胆汤
D.瓜蒌薤白白酒汤
E.小陷胸汤
- 51.实脾散的功用是
A.利水渗湿,温阳化气
B.温阳健脾,行气利水
C.解表化湿,理气和中
D.温阳利水
E.温中散寒,行气散满
- 52.由半夏、苏叶、茯苓、厚朴、生姜组成的方剂名为
A.厚朴温中汤
B.二陈汤
C.半夏厚朴汤
D.平胃散
E.实脾散
- 53.麦门冬汤中麦冬与半夏的配伍比例为例
A.1 : 1
B.2 : 1
C.5 : 1
D.7 : 1
E.10 : 1
- 54.上消化道出血最常见的原因是
A.贲门癌
B.肝硬化
C.食管出血
D.消化性溃疡
E.血液病
- 55.稽留热常见于哪种疾病
A.肺结核
B.疟疾
C.伤寒
D.百日咳
E.支气管扩张
- 56.震颤性麻痹的病人可出现
A.慌张步态
B.醉酒步态
C.鸭态
D.蹒跚步态
E.共济失调步态
- 57.关于体位哪项错误
A.意识障碍的患者常是强迫体位
B.心源性哮喘的患者常是坐位
C.脑膜炎患者可见角弓反张位
D.胸膜疾患的病人多采取侧卧位
E.胆道蛔虫症者可出现辗转体位
- 58.下列哪项不会出现语颤减弱或消失
A.肺气肿
B.肺梗死
C.阻塞性肺不张
D.大量胸腔积液
E.气胸
- 59.中枢性面瘫不会出现哪种改变
A.一侧鼻唇沟变浅

- B. 一侧额纹消失
C. 不能鼓腮
D. 一侧口角下垂
E. 不能露齿
60. 胸骨左缘第 1、2 肋间及其附近区域听到连续性杂音见于
A. 二尖瓣狭窄
B. 二尖瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 肺动脉瓣狭窄
E. 肺动脉瓣关闭不全
61. 主动脉瓣关闭不全最不可能出现的体征是
A. 水冲脉
B. 主动脉瓣区第二心音亢进
C. 主动脉瓣区闻及叹气样舒张期杂音
D. 心尖部可闻及柔和的舒张期隆隆样杂音
E. 心浊音界呈靴形
62. 下列各项中不包括在现病史中的是
A. 主要症状
B. 伴随症状
C. 一般情况
D. 父母兄妹是否有同样疾病
E. 诊治经过
63. 在胸骨左缘第 3、4 肋间触及收缩期震颤, 应考虑的疾病是
A. 二尖瓣狭窄
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 三尖瓣狭窄
D. 室间隔缺损
E. 肺动脉瓣狭窄
64. 肝脏缩小见于
A. 肝脓肿
B. 肝囊肿
C. 肝癌
D. 急性和亚急性重型肝炎
E. 脂肪肝
65. 心绞痛发作时心电图的改变是
A. P 波高尖
B. 异常 Q 波
C. S-T 段水平压低 0.1 mV 以上
D. 完全性右束支传导阻滞
E. P-R 间期延长
66. 女性成人血红细胞的正常值是
A. $(3.0 \sim 4.5) \times 10^{12}/L$
B. $(3.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$
C. $(4.5 \sim 6.0) \times 10^{12}/L$
D. $(2.5 \sim 5.0) \times 10^{12}/L$
E. $(6.0 \sim 7.0) \times 10^{12}/L$
67. 下列哪种疾病中性粒细胞增多
A. 百日咳
B. 自身免疫性疾病
C. 糖尿病酮症酸中毒
D. 脾功能亢进
E. 伤寒
68. 下列哪种疾病血小板增多
A. 脾功能亢进
B. 急性出血后
C. 弥散性血管内凝血
D. 药物中毒
E. 尿毒症
69. 血清甲胎蛋白阳性最常见的疾病是
A. 原发性肝癌
B. 生殖腺胚胎肿瘤
C. 肝硬化
D. 转移性肝癌
E. 卵巢癌
70. 下列哪种疾病大便潜血试验为持续阳性
A. 胃溃疡
B. 十二指肠溃疡
C. 萎缩性胃炎
D. 胃癌
E. 慢性胆囊炎
71. 尿菌阳性提示尿路感染时, 尿菌落计数的数值应大于
A. $10^9/mL$

- B. 10^8 /mL
C. 10^7 /mL
D. 10^6 /mL
E. 10^5 /mL
72. 关于溶血性黄疸, 下列哪项是不符合的
- A. 血清总胆红素增高
B. 间接胆红素增高
C. 尿中胆红素呈阳性反应
D. 尿中尿胆原增多
E. 粪便颜色变深
73. 下列描述肺气肿的 X 线表现哪项是不适当的
- A. 肺野透过度增加
B. 肺纹理稀少纤细
C. 两肺内见散在多个大小不等的结节影
D. 横膈下降呈“八”字形
E. 肋间隙增宽, 胸廓呈桶状
74. 《希波克拉底誓言》中提出的医德根本原则是
- A. 为病家谋利益
B. 平等对待患者
C. 保守机密

- D. 不为妇人施堕胎手术
E. 不伤害病人
75. 医生的特殊干涉权应除外
- A. 控制想要自杀的患者的行为
B. 依法隔离 SARS 患者
C. 中止出现高度危险的治疗性人体实验
D. 拒绝病人放弃治疗的要求
E. 隐瞒真相, 不对患者诉说不良诊断和预后
76. 体格检查时医生首先应做到的是
- A. 尊重病人的人格
B. 态度热情
C. 客观求实
D. 安全保密
E. 认真负责
77. 在使用辅助检查时, 哪一项是不适宜的
- A. 严格地掌握适应证
B. 应该广泛地依赖辅助检查
C. 有利于提高医生认识疾病的能力
D. 应从患者的利益出发决定做什么项目
E. 结合临床应用辅助检查手段

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

78. 患者, 男, 55 岁。体胖, 患“高血压”六年余, 近两日自觉心前区闷痛, 时感心悸, 短气, 舌淡苔白腻, 脉沉弦的临床意义是
- A. 心脉痹阻证
B. 痰阻心脉证
C. 肝气郁结证
D. 血瘀心脉证
E. 痰迷心窍证

79. 某男, 42 岁。干咳 1 年, 未认真治疗, 近因参加劳动, 咳嗽加剧, 并咳血数口, 现痰中带血丝, 心烦, 自感手足心热, 睡时常出汗, 小便少, 大便干, 舌红苔少而干, 脉细数。临床诊断最可能是
- A. 燥邪犯肺证
B. 热邪壅肺证
C. 肝火犯肺证

- D.肺阴虚证
- E.以上都不是

80.患者,男,50岁。眩晕欲仆,头重脚轻,筋惕肉瞤,肢麻震颤,腰膝酸软,舌红苔薄白,脉弦细的临床意义是

- A.肝阳上亢
- B.肝阳化风
- C.肝肾阴虚
- D.阴虚风动
- E.肝血不足

81.患者,男,20岁。5天前受凉后出现恶寒发热,无汗,咳嗽,夜间加剧,咳痰稀薄色白,舌苔薄白,脉浮紧的临床意义是

- A.寒邪客肺证
- B.痰湿阻肺证
- C.风寒束肺证
- D.燥邪犯肺证
- E.饮停于肺证

82.某女,21岁。近2个月,每至经期前一周即开始两乳胀痛,经期后延10~12天,量中等,色暗红有块,经行小腹胀痛,烦躁失眠,舌暗,脉弦有力。临床诊断最可能是

- A.气滞血瘀证
- B.肝气郁结证
- C.气血两虚证
- D.寒凝血瘀证
- E.以上全都不是

83.某男,58岁。患“高血压”已近十年,头晕胀痛,耳鸣,梦多寐差,腰膝酸软,舌红苔少,脉弦细数,临床诊断最可能是

- A.肝火上炎证
- B.肝肾阴虚证
- C.肝阳上亢证
- D.肝阴虚证
- E.肾阴虚证

84.患者,男,47岁。病者长期感腰膝酸软,听力减退,尿频,夜尿多,滑精,舌质淡,脉弱的临床意义是

- A.肾精不足

- B.肾气不固
- C.肾阴虚
- D.肾阳虚
- E.肺肾气虚

85.某女,42岁。患“慢性胃炎”3年,胃脘隐痛,食后胀满,暖气呃逆,虽饥而不欲多食,大便干,舌红无苔,脉细无力。临床诊断最可能是

- A.脾气虚证
- B.脾胃气虚证
- C.胃阴虚证
- D.脾阴虚证
- E.肝胃不和证

86.某男,62岁。患咳喘近20年,每至冬季加重,胸闷痰鸣,痰多清稀泡沫,入夜难以平卧,心悸,舌淡苔白滑,脉弦。临床诊断最可能是

- A.痰湿阻肺证
- B.寒邪客肺证
- C.饮停于肺证
- D.肺气虚证
- E.肾不纳气证

87.某女,32岁。下岗后心情不好,近半个月自感胃脘痞满,暖气时作,纳谷不香,胸闷喜叹息,舌正常,脉弦。临床诊断最可能是

- A.肝气郁结证
- B.肝气横逆证
- C.肝胃不和证
- D.肝郁脾虚证
- E.气滞证

88.患儿,2岁。高热3天,面红目赤,胸腹灼热,四肢逆冷,小便黄少,大便已3日未行,舌红绛,苔黄厚而干,脉滑数,指纹紫暗,已达命关。临床诊断最可能是

- A.表寒里热证
- B.虚热证
- C.亡阳证
- D.真寒假热证

- E.真寒假寒证
- 89.某男,58岁。胸胁胀满,咳唾引痛,舌苔白滑,脉弦。临床诊断最可能是
- A.饮停于肺证
B.饮停胸胁证
C.痰湿阻肺证
D.肝气郁结证
E.寒邪客肺证
- 90.患者女子,带下色黄臭,外阴瘙痒的临床意义是
- A.膀胱湿热
B.脾胃湿热
C.大肠湿热
D.肝胆湿热
E.肝火上炎
- 91.患者风寒感冒兼胸脘痞闷,食少纳呆,脉濡者,治疗应首选
- A.荆防败毒散
B.香苏散
C.杏苏散
D.羌活胜湿汤
E.三仁汤
- 92.患者热病后期,气阴两伤,余热未清,胃失和降,见身热汗出,渴饮少食,气逆欲呕,舌红苔少,脉虚数等。治宜选用
- A.竹叶石膏汤
B.麦门冬汤
C.白虎汤加人参汤
D.清暑益气汤
E.青蒿鳖甲汤
- 93.患者往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,心下满痛,大便不解,舌苔黄,脉弦数有力,治宜选用
- A.小柴胡汤
B.大柴胡汤
C.小承气汤
D.蒿芩清胆汤
E.四逆散
- 94.暑季,患者身热汗多,咽干口渴,体倦

气短,舌红少津,脉虚细,治宜选用

- A.生脉散
B.白虎汤
C.白虎汤加人参汤
D.清暑益气汤
E.六一散
- 95.患者寒热如疟,寒轻热重,口苦胸闷,干呕呃逆,胸胁胀痛,舌红苔白,脉数而右滑左弦。治疗应首选
- A.左金丸
B.小柴胡汤
C.逍遥散
D.蒿芩清胆汤
E.龙胆泻肝汤
- 96.孕妇3个月,胎动出血,食少神疲,面色无华,气短乏力,舌淡苔白,脉细弱。治宜选用
- A.温经汤
B.胶艾汤
C.泰山磐石散
D.桂枝茯苓丸
E.肾气丸
- 97.患者久患水肿,水邪郁而化热伤阴,出现水邪潴留与津液亏耗并见之象。治疗应首选
- A.五苓散
B.五皮散
C.胃苓汤
D.猪苓汤
E.生脉散
- 98.患者,汗出恶风,面色㿔白,舌淡苔薄白,脉浮虚软者,治宜选用
- A.当归六黄汤
B.牡蛎散
C.桂枝汤
D.玉屏风散
E.黄芪防己汤
- 99.患者一身面目俱黄,黄色鲜明,腹微满,口渴,小便不利,舌苔黄腻,脉沉数。治

疗应选用

- A.三仁汤
- B.茵陈蒿汤
- C.藜蘼分清饮
- D.蒿芩清胆汤
- E.甘露消毒丹

100.患者患温病,证见神昏谵语,痰多气粗,身热烦躁,舌红苔黄腻,治宜选用

- A.紫雪丹
- B.至宝丹
- C.大承气汤
- D.羚角钩藤汤
- E.苏合香丸

101.患者,男,60岁。咳嗽,吐痰,反复发作5年,近1周症状加重。检查:体温正常,两肺散在干、湿啰音,血白细胞 $11 \times 10^9/L$,中性粒细胞 0.8。应首先考虑的是

- A.急性支气管炎
- B.慢性支气管炎急性发作
- C.肺结核
- D.支气管哮喘
- E.肺癌

102.患者,男,35岁。素有溃疡病史,1个月来饭后腹部饱胀不适,3天来反复呕吐隔餐或隔日食物,呕吐后舒适,患者消瘦,口干,皮肤弹性差,查体有胃型、胃蠕动波及逆蠕动波,餐后8小时有震水音。临床诊断最可能是

- A.肠梗阻
- B.腹膜炎
- C.幽门梗阻
- D.肝硬化
- E.肝炎

103.某女,26岁。2天来脐周腹痛,呈阵发性疼痛,且伴黑便,1周前曾进食虾蟹,此后全身散在有荨麻疹。查体:脐周皮肤及下肢可见紫癜,肝脾未及,肠鸣音亢进,大便潜血(+).临床诊断最可能是

- A.急性糜烂性胃炎

- B.十二指肠溃疡合并出血
- C.胃溃疡合并出血
- D.肠结核
- E.过敏性紫癜

104.某男,72岁。夜间睡眠中突感心前区疼痛,含硝酸甘油不缓解,继之出现呼吸困难,不能平卧。心电图检查示: $V_1 \sim V_5 S-T$ 段弓背向上抬高,且有宽而深的Q波。其是哪个部位的心肌梗死

- A.急性非Q波心肌梗死
- B.急性心内膜下心肌梗死
- C.急性前壁心肌梗死
- D.急性广泛前壁心肌梗死
- E.急性前间壁心肌梗死

105.患者,女,32岁。低热、胸闷、气促15天。查体:颈静脉怒张,心界向两侧明显扩大,坐位时呈三角形,仰卧位心底部浊音区增宽。最可能的诊断是

- A.急性心肌梗死
- B.结核性心包炎伴心包积液
- C.缩窄性心包炎
- D.扩张型心肌病
- E.缺血性心肌病

106.患者,男,70岁。近5年来乏力,尿频,每晚尿5~6次,但无尿痛、尿急。昨日大量饮酒后下腹部胀痛逐渐加重,查体:在耻骨联合上区可触到一圆形具有压痛的弹性肿物。临床诊断最可能是

- A.肾结石
- B.多囊肾
- C.前列腺肥大合并尿潴留
- D.肾结核
- E.输尿管结石

107.某女,25岁。发冷发热2天,最高体温 $39^\circ C$,伴腰痛,尿痛、尿频、尿急。查咽稍充血,肋脊角及肋腰角有明显叩击痛。临床诊断最可能是

- A.急性尿道炎
- B.急性肾盂肾炎

- C.急性膀胱炎
D.急性子宫内膜炎
E.急性输卵管炎

108.某男,28岁。3天前出现高热,体温39.2℃,胸痛,咳嗽,咳痰,白细胞 $21 \times 10^9/L$,中性占0.90,X线胸片显示:右上叶大片状阴影,考虑下述哪种病变

- A.肺炎链球菌肺炎
B.肺结核
C.肺癌
D.慢性支气管炎
E.肺脓肿

109.患者因反复出现皮肤出血,感染,贫血而就诊,检查后被确诊为慢性再障,最不

可能出现的检查结果是

- A.出血时间延长
B.网织红细胞百分比正常
C.凝血时间延长
D.毛细血管脆性试验阳性
E.红细胞形态大小均正常

110.溃疡性结肠炎病变最常发生的部位是

- A.降结肠
B.直肠及乙状结肠
C.全结肠
D.横结肠
E.回肠末段及升结肠

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(111~112题共用备选答案)

- A.内热证
B.外感表证
C.风证、痛证
D.虚证
E.血络郁闭

111.小儿指纹色鲜红主

112.小儿指纹色淡主

(113~114题共用备选答案)

- A.胆郁痰扰证
B.痰火扰神证
C.肝阳化风证
D.痰蒙心神证
E.心火亢盛证

113.表情淡漠,神识痴呆,精神抑郁,喃喃独语,苔腻,脉滑的临床意义是

114.突然昏仆,不省人事,口吐涎沫,喉有痰声,手足抽搐的临床意义是

(115~116题共用备选答案)

- A.花剥而兼腻苔
B.黄腻苔
C.薄白苔
D.黑而燥裂苔
E.黑而滑润苔

115.热极津枯可见

116.痰浊未化,正气已伤者,可见

(117~118题共用备选答案)

- A.脉位的浮沉
B.脉力的大小
C.脉形的长短
D.脉率的快慢
E.脉律的齐否

117.濡脉与弱脉的主要不同点,在于

118.结脉与促脉的主要不同点,在于

(119~120题共用备选答案)

- A.肝阳上亢证

- B.肾阴虚证
C.肝阴虚证
D.肝火上炎证
E.肝血虚证
- 119.耳鸣如蝉,眩晕,腰膝酸软多见于
120.耳鸣如潮,眩晕,胸胁灼痛多见于
(121~122题共用备选答案)
A.胃寒证
B.胃火证
C.胃阴虚证
D.肝胃不和证
E.食滞胃脘证
- 121.胃脘胀痛,噎腐吞酸多见于
122.胃脘胀痛,吞酸嘈杂,胸胁闷胀多见于
(123~124题共用备选答案)
A.玉女煎
B.导赤散
C.六一散
D.黄连解毒汤
E.竹叶石膏汤
- 123.心胸烦热,口渴面赤,口舌生疮者,治疗应选用
124.小便短赤,溲时热涩刺痛者,治疗应选用
(125~127题共用备选答案)
A.涩肠固脱,益气养血
B.温肾暖脾,涩肠止泻
C.益气固表,育阴除烦
D.滋阴泻火,固表止汗
E.益气生津,敛阴止汗
- 125.生脉散的功用是
126.四神丸的功用是
127.当归六黄汤的功用是
(128~129题共用备选答案)
A.健脾益肺
B.滋肾养肝
C.滋肾养心
D.温补肾阳
E.补脾养心
- 128.参苓白术散和炙甘草汤均具有的治疗作用是
129.六味地黄丸和左归丸均具有的治疗作用是
(130~132题共用备选答案)
A.清胃散
B.玉女煎
C.大补阴丸
D.左归丸
E.一贯煎
- 130.含有沙参、麦冬的方剂是
131.含有升麻、黄连的方剂是
132.含有龟胶、鹿胶的方剂是
(133~134题共用备选答案)
A.活血祛瘀
B.补肝肾,强筋骨
C.引血下行
D.利尿通淋
E.排脓止痛
- 133.牛膝在天麻钩藤饮中的主要作用是
134.牛膝在镇肝息风汤中的主要作用是
(135~136题共用备选答案)
A.闭目难立征阳性
B.巴宾斯基征阳性
C.拉塞格征阳性
D.克尼格征阳性
E.手足抽搐
- 135.脑血栓形成时
136.脑膜炎时
(137~138题共用备选答案)
A.意识障碍伴发热
B.意识障碍伴低血压
C.意识障碍伴瞳孔缩小
D.意识障碍伴高血压
E.意识障碍伴瞳孔散大
- 137.有机磷农药中毒时
138.乌头碱中毒时
(139~140题共用备选答案)
A.杵状指

- B.匙状甲
C.爪形手
D.“助产士”手
E.梭形关节
- 139.尺神经损伤
140.支气管扩张
(141~142 题共用备选答案)
A.中性粒细胞增多
B.淋巴细胞增多
C.单核细胞增多
D.嗜酸性粒细胞增多
E.嗜碱性粒细胞增多
- 141.支气管哮喘时
142.急性大出血时
(143~144 题共用备选答案)
A.病理性 Q 波
B.胸痛,咳暗红色黏液痰,心电轴右偏,肺型 P 波
C.心电图 S-T 段普遍弓背向下型抬高
D.水冲脉
E.脉搏短绌
- 143.主动脉瓣关闭不全时
144.心房颤动时
(145~146 题共用备选答案)
A.强迫实验
B.天然实验
C.志愿实验
D.临床实验
E.自我实验
- 145.由于战争、自然灾害可形成大面积的研究样本群称为
146.应用政治军事压力从事违背伦理原则的试验称为
(147~148 题共用备选答案)
A.医德评价
B.医德教育
C.医德实践
D.医德修养
E.医德情操
- 147.培养全面、合格的医学人才的重要手段是
148.对医疗单位的医务人员行为进行善恶评价的方式是
(149~150 题共用备选答案)
A.急性病患者或虽病情较重但他们头脑是清醒的
B.长期慢性病人已具有一定医学科学知识水平
C.医生和病人具有近似同等的权利
D.医患双方在医疗活动中都是主动的,医生有权威性,充当指导者
E.医患双方不是双向作用,而是医生对病人单向发生作用
- 149.指导-合作型的特点是
150.主动-被动型的特点是

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	C	C	A	D	B	D	D	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	D	B	B	E	C	D	C	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	D	D	B	D	E	E	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	E	C	C	B	D	A	D	E	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	C	A	E	A	D	D	C	A
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	C	D	D	C	A	A	B	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	D	D	D	C	B	C	B	A	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	C	C	A	D	A	B	B	D	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	C	B	C	C	C	E	B	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	A	B	D	D	C	D	D	B	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	C	E	D	B	C	B	A	B	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	D	D	C	D	A	A	D	B	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	D	B	B	E	B	D	A	B	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	D	C	C	B	D	C	E	C	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
D	A	D	E	B	A	B	A	D	E

第三单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 感冒的病位在
 - A. 心
 - B. 肝
 - C. 脾
 - D. 肺卫
 - E. 肾
2. 感冒首辨
 - A. 风寒
 - B. 风热
 - C. 暑湿证
 - D. 普通、时行
 - E. 虚体、实体
3. 感冒的基本病机是
 - A. 邪犯于肺, 肺气上逆
 - B. 风热犯肺, 卫表失和
 - C. 暑湿遏表, 卫表不和
 - D. 风寒外束, 卫阳被郁
 - E. 卫表不和, 肺失宣肃
4. 感冒与温病早期鉴别不包括
 - A. 发热有无及高低
 - B. 汗出热退与否
 - C. 脉静与否
 - D. 热势复起与否
 - E. 小便黄赤与否
5. 外邪侵袭人体, 是否引起感冒发病, 取决于
 - A. 起居失常
 - B. 寒温失常
 - C. 饮食不当
 - D. 正气强弱
 - E. 气候突变
6. 水肿治疗的基本原则
 - A. 泻下逐水
 - B. 发汗、利尿
 - C. 峻下逐水
 - D. 发汗、利尿、泻下逐水
 - E. 发汗、攻逐水饮
7. 肺癆发病的主要关键是
 - A. 癆虫传染
 - B. 正气虚弱
 - C. 与肺癆患者有密切接触
 - D. 内伤久病
 - E. 营养不良
8. 治疗癃闭肝郁气滞证, 宜选用的方剂是
 - A. 沉香散
 - B. 柴胡疏肝散
 - C. 逍遥散
 - D. 七味都气丸
 - E. 小柴胡汤
9. 患者, 心悸, 善惊易恐, 坐卧不安, 舌苔薄白, 脉象虚弦。属下列何种证候
 - A. 心血不足
 - B. 心虚胆怯
 - C. 饮邪上犯
 - D. 心阴不足
 - E. 心阳衰弱
10. 胸痹总属本虚标实之证, 其标实常见

为下列哪项以外

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰浊
- D. 阴寒
- E. 火邪

11. 不寐的基本病机是

- A. 本虚标实, 气血失调
- B. 阳盛阴衰, 阴阳失调
- C. 阳气不足, 阴寒内盛
- D. 气血凝滞, 心脉痹阻
- E. 气机逆乱, 升降失常

12. 肝郁化火型不寐者, 宜首选

- A. 安神定志丸
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 黄连阿胶汤

13. 治疗虚体感冒之气虚感冒, 首选的方剂是

- A. 葱豉桔梗汤
- B. 加减葶藶汤
- C. 荆防达表汤
- D. 新加香薷饮
- E. 参苏饮

14. 阳明经头痛的部位是

- A. 头后部, 下连于项
- B. 前额部及眉棱处
- C. 头之两侧, 并连及耳部
- D. 巅顶部位, 或连于目系
- E. 前额部

15. 眩晕的病机, 除哪项以外皆是

- A. 肝阳上亢
- B. 气血亏虚
- C. 肾精不足
- D. 痰浊中阻
- E. 外邪阻窍

16. 患者眩晕, 动则加剧, 劳则即发, 面色淡白, 唇甲不华, 心悸少寐, 神疲懒言, 饮食

减少, 舌质淡, 脉细弱。其治法是

- A. 健脾益气, 益肾温中
- B. 温补脾肾, 通络宁心
- C. 健脾益肾, 活血化瘀
- D. 补益肝肾, 化瘀通络
- E. 补养气血, 调养心脾

17. 辨别阳闭、阴闭二证除下列哪项外均是主要根据

- A. 颜面潮红与面白唇暗
- B. 躁动不安与静而不烦
- C. 舌苔白腻与舌苔黄腻
- D. 脉沉滑缓与脉弦滑数
- E. 肢体软瘫与肢体强痉

18. 下列哪项不是癫证的治法

- A. 舒肝理气
- B. 化痰开窍
- C. 涤痰泻火
- D. 补养心脾
- E. 养血安神

19. 痴呆的基本病机为

- A. 心气虚衰, 心血不足
- B. 肾精亏损, 痰蒙清窍
- C. 气机不畅, 血行瘀滞
- D. 以虚为本, 虚实夹杂
- E. 髓减脑消, 神机失用

20. 下列除哪项外, 均为肝气犯胃型胃痛的主证

- A. 胃脘胀满, 攻撑作痛, 脘痛连肋
- B. 每因情志因素而痛作
- C. 暖气频繁
- D. 喜长叹息
- E. 脉象弦数

21. 痞满的基本病位在

- A. 脾
- B. 脾胃
- C. 胃
- D. 肝脾
- E. 肝胆

22. 下列哪项不是肝气犯胃型呕吐的

主证

- A. 呕吐吞酸
- B. 暖气频繁
- C. 胸胁满痛
- D. 舌边红苔薄腻
- E. 脉沉细

23. 治疗脾胃气虚型呕吐的最佳方剂为

- A. 小半夏加茯苓汤
- B. 理中汤
- C. 旋覆代赭汤
- D. 香砂六君子汤
- E. 平胃散

24. 治疗哮喘发作期冷哮证, 应首选的方剂是

- A. 定喘汤或越婢加半夏汤
- B. 小青龙加石膏汤
- C. 三子养亲汤
- D. 射干麻黄汤
- E. 平喘固本汤

25. 呃逆的发生, 除了缘于胃气上逆动膈以外, 与哪一脏关系最密切

- A. 心
- B. 脑
- C. 肝
- D. 肺
- E. 肾

26. 湿热腹痛证宜选方

- A. 大承气汤
- B. 玉女煎
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 大黄黄连泻心汤
- E. 泻青丸

27. 导致泄泻发生的重要因素在于

- A. 脾胃虚弱
- B. 肾阳虚衰
- C. 感受外邪
- D. 食滞肠胃
- E. 脾虚湿盛

28. 泄泻与痢疾的鉴别点, 下列何项无鉴

别意义

- A. 泻下爽利与否
- B. 泻下有无脓血
- C. 泻下次数之多少
- D. 里急后重之有无
- E. 泻下稀薄或赤白黏冻

29. 下列除哪项外均为痢疾的治法

- A. 湿盛则分利
- B. 初痢宜通
- C. 久痢宜涩
- D. 赤多重用血药
- E. 白多重用气药

30. 用麻子仁丸治疗的是

- A. 气秘
- B. 热秘
- C. 冷秘
- D. 气虚秘
- E. 血虚秘

31. 胁痛的辨证, 当以何者为主

- A. 气血
- B. 寒热
- C. 表里
- D. 虚实
- E. 脏腑

32. 龙胆泻肝汤适用于以下除哪项以外的病证

- A. 肝郁化火型不寐
- B. 肝胆湿热型胁痛
- C. 肝火上炎型鼻衄
- D. 肝郁气滞型聚证
- E. 肝火犯胃型吐血

33. 黄疸的治疗大法是

- A. 清热化湿
- B. 通利腑气
- C. 清热解毒
- D. 化湿邪, 利小便
- E. 温中化湿

34. 下列除哪项外均为急黄的主症

- A. 突然高热

- B.神昏谵语
C.黄疸迅速加深
D.舌质淡,苔白腻
E.衄血,大便黑,小便短赤
- 35.治疗瘀血内结积证的主方是
A.血府逐瘀汤
B.丹参饮
C.身痛逐瘀汤
D.膈下逐瘀汤
E.旋覆花汤
- 36.哪一项不属于水肿与鼓胀的鉴别要点
A.肿胀部位
B.肿胀的先后顺序
C.肿处皮肤的色泽
D.小便通利与否
E.腹壁青筋有无暴露
- 37.哮病发作时的基本病理变化是
A.肺失宣降
B.痰气闭阻
C.伏痰引触
D.肺气不清
E.肺气虚寒
- 38.下列除哪项外均是鼓胀的病因
A.酒食不节
B.情志刺激
C.虫毒感染
D.病后续发
E.风邪外袭
- 39.身肿,腰以下为甚,面色萎黄,神倦肢冷,小便短少,脘腹胀闷,应用何方治疗
A.黄芪建中汤
B.实脾饮
C.黄芪汤
D.真武汤
E.越婢汤
- 40.鉴别淋证与癃闭的关键点在于
A.有无小便短赤灼热
B.有无排尿困难
C.有无小便浑浊
D.有无排尿疼痛
E.有无小便量少
- 41.下列除哪项外均是郁证的临床表现
A.心情抑郁
B.情绪不宁
C.小便不通
D.胸部满闷
E.胁肋胀痛
- 42.郁证的病位多在
A.心、脾、胃
B.肝、脾、胃
C.肝、脾、肾
D.肝、胃、肾
E.心、肝、脾
- 43.下列哪一项不是尿血的病因
A.下焦热盛
B.阴虚火旺
C.脾不统血
D.肾气不固
E.肾阳不足
- 44.痰饮的治疗原则是
A.温阳利水
B.清热化痰
C.温化
D.温肾化饮
E.温肺化饮
- 45.下列各项,哪一项不是消渴病的病机特点
A.阴虚为本,燥热为标
B.气阴两伤,阴阳俱虚
C.阴虚燥热,变证百出
D.痰火内阻,湿热阻滞
E.消渴发病,有关血瘀
- 46.邪热郁蒸型汗证特点为
A.汗出恶风
B.蒸蒸汗出
C.手足心汗出
D.头汗出

- E.汗出畏寒
- 47.齿衄,胃火炽盛证选方为
- A.玉女煎
B.清胃散
C.茜根散
D.加味清胃散合泻心汤
E.六味地黄丸
- 48.虚劳的辨证当以何为纲
- A.气血阴阳
B.阴阳
C.气血
D.五脏虚候
E.以上均是
- 49.内伤咳嗽的主要病理因素是
- A.内风
B.湿、热
C.瘀血
D.痰、火
E.气滞
- 50.肾虚腰痛,日久不愈,无明显阴阳偏盛者,宜选方
- A.左归丸
B.右归丸
C.大补元煎
D.大补阴丸
E.青娥丸
- 51.上肢内侧中间分布的经脉是
- A.手太阴肺经
B.手阳明大肠经
C.手厥阴心包经
D.手少阳三焦经
E.手少阴心经
- 52.腹部经脉由内而外排列的顺序为
- A.足厥阴、足少阴、足阳明、足太阳
B.足少阴、足阳明、足太阳、足太阴
C.足阳明、足少阴、足太阳、足厥阴
D.足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
E.足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
- 53.根据骨度分寸,臀横纹至膝中
- A.18寸
B.16寸
C.14寸
D.13寸
E.以上均不是
- 54.足太阴脾经与手少阴心经循行交接的部位是
- A.肺中
B.胸中
C.心中
D.手小指端
E.足大趾端
- 55.患者患有子宫脱垂症,求助于针灸治疗,首先应用
- A.毫针平补平泻法
B.毫针补法
C.灸法
D.拔罐疗法
E.毫针泻法
- 56.以下哪种疾病不适于用三棱针放血治疗
- A.高热
B.中风闭证
C.急性咽喉肿痛
D.中风脱证
E.目赤肿痛
- 57.下列穴位哪一对不是八脉交会穴
- A.列缺、照海
B.后溪、申脉
C.合谷、列缺
D.外关、足临泣
E.后溪、外关
- 58.平第二骶椎棘突下,旁开1.5寸的腧穴是
- A.膀胱俞
B.中膂俞
C.白环俞
D.胞育
E.小肠俞

- 59.采用背俞穴治疗皮肤痒疹应首选
- 肝俞
 - 肺俞
 - 脾俞
 - 三焦俞
 - 心俞
- 60.下列穴位中治疗胎位不正应首选
- 足窍阴
 - 厉兑
 - 至阴
 - 隐白
 - 大敦
- 61.下列说法正确的是
- 华佗夹脊穴自第1颈椎至第5腰椎,各椎棘突下旁开0.5寸
 - 华佗夹脊穴自第1颈椎至第4骶椎,各椎棘突下旁开0.5寸
 - 华佗夹脊穴自第1胸椎至第4骶椎,各椎棘突下旁开0.5寸
 - 华佗夹脊穴自第1胸椎至第5腰椎,各椎棘突下旁开0.5寸
 - 华佗夹脊穴共用穴位28对
- 62.下列腧穴中不是下合穴的是
- 足三里
 - 阳陵泉
 - 委中
 - 阴陵泉
 - 委阳
- 63.治疗痰证,下列穴位宜首选
- 足三里
 - 丰隆
 - 阴陵泉
 - 合谷
 - 列缺
- 64.在肱骨内上髁与尺骨鹰嘴之间的是
- 少海
 - 小海
 - 天井
 - 阳谷
 - 肘尖
- 65.能治疗疝气、少腹痛的腧穴是
- 隐白
 - 太白
 - 大敦
 - 大都
 - 关元
- 66.太阳穴的定位是
- 眉梢与目外眦之间,向后约1横指的凹陷处
 - 眉梢与目外眦之间,向后约2横指的凹陷处
 - 目外眦向后约2横指
 - 目外眦向后约1横指
 - 目正视,瞳孔直上,眉上1寸
- 67.位于腕背横纹桡侧,当拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中的腧穴是
- 大陵
 - 太渊
 - 阳溪
 - 神门
 - 阳池
- 68.循行“入上齿”的经脉是
- 小肠经
 - 胃经
 - 大肠经
 - 脾经
 - 肝经
- 69.五输穴从四肢末端向肘膝方向排列顺序是
- 井、经、输、荣、合
 - 井、合、经、荣、输
 - 井、荣、输、经、合
 - 井、输、荣、经、合
 - 以上均不是
- 70.疾徐补泻手法中的泻法是
- 疾速刺入,多捻转,徐徐出针
 - 疾速刺入,多捻转,快出针
 - 疾速刺入,少捻转,快出针

- D.徐徐刺入,多捻转,徐徐出针
E.疾速刺入,少捻转,徐徐出针
- 71.手足三阳经在四肢分布的规律是
A.太阳在前,少阳在中,阳明在后
B.太阳在前,阳明在中,少阳在后
C.阳明在前,太阳在中,少阳在后
D.阳明在前,少阳在中,太阳在后
E.少阳在前,阳明在中,太阳在后
- 72.对于肺热咯血病人,首选下列
A.肺经原穴——太渊
B.大肠经络穴——偏历
C.肺经郄穴——孔最
D.大肠经郄穴——温溜
E.背俞穴——肺俞、大肠俞
- 73.下列八脉交会穴中,属于太阳经的是
A.列缺、照海
B.后溪、申脉
C.合谷、列缺
D.外关、足临泣
E.后溪、外关
- 74.下列各项,具有回阳救逆作用的是
A.气海、膻中
B.神阙、关元
C.中脘、足三里
D.气海、合谷
E.大椎、关元
- 75.条口旁开一横指的是
A.足三里
B.丰隆
C.阴陵泉
D.合谷
E.列缺
- 76.治疗口眼歪斜应首选
A.解溪
B.足三里
C.丰隆
D.合谷
E.曲池
- 77.治疗胃脘疼痛,或隐痛或胀痛或刺

痛,针灸取穴是

- A.胃俞、脾俞、太冲
B.期门、阳陵泉、中脘
C.三阴交、膈俞、中脘
D.合谷、太冲、中脘
E.足三里、内关、中脘

78.颈椎病的治疗处方主穴是

A.颈夹脊、大椎、风池、曲池、悬钟、阿是穴

B.颈夹脊、天柱、风池、曲池、悬钟、阿是穴

C.颈夹脊、合谷、风池、曲池、悬钟、阿是穴

D.颈夹脊、天柱、风府、曲池、悬钟、阿是穴

E.颈夹脊、天柱、风池、曲池、太溪、阿是穴

79.针灸治疗月经不调应取哪些经脉

- A.任脉、足太阴经
B.任脉、足厥阴经
C.任脉、足少阴经
D.带脉、冲脉、任脉
E.任脉、督脉、冲脉

80.治疗耳聋虚证,应选用以下哪组腧穴

为主

- A.合谷、神门、翳风
B.百会、耳门、风池
C.太溪、肾俞、听宫、翳风
D.翳风、听会、中渚、侠溪
E.太冲、耳门、听宫

81.十二经脉的交接:阴经交阳经的部位是

- A.头部
B.胸腹部
C.面部
D.四肢末端
E.上部

82.下面所列穴位,哪个是心经的原穴

- A.太冲

- B.大陵
 - C.太渊
 - D.合谷
 - E.神门
- 83.平补平泻手法是指
- A.进针得气后均匀地提插、捻转后即可出针
 - B.既有补又有泻
 - C.先补后泻
 - D.先泻后补
 - E.补法泻法交替使用
- 84.下列腧穴中,哪一个八脉交会穴中
通于阳维脉的
- A.偏历
 - B.外关
 - C.丰隆
 - D.太冲
 - E.公孙
- 85.在下列特定穴中治疗脏病一般多用
- A.合穴
 - B.络穴
 - C.俞穴

- D.输穴
 - E.募穴
- 86.募穴的主要作用,是诊察和治疗与之
相关的
- A.五脏疾患
 - B.六腑疾患
 - C.经脉疾患
 - D.五体疾患
 - E.五官疾患
- 87.膀胱的募穴是
- A.天枢
 - B.中脘
 - C.中极
 - D.期门
 - E.京门
- 88.八脉交会穴中列缺和后溪,分别是
- A.通督脉与通阳跷脉的腧穴
 - B.通阴维与通冲脉的腧穴
 - C.通督脉与通任脉的腧穴
 - D.通冲脉与通带脉的腧穴
 - E.通任脉与通阴跷脉的腧穴

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请
从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 89.患者钱某,女,38岁。身热,汗少,肢
体酸重,头昏重胀,心烦口黏,苔薄黄腻,脉
濡数。治宜选用
- A.荆防败毒散
 - B.藿香正气散
 - C.玉屏风散
 - D.新加香薷饮
 - E.参苏饮
- 90.某患者系肺虚久咳病人,兼有倦怠乏
力之证,医生用六君子汤治疗后好转。此法

- 符合中医哪种治则
- A.急则治其标,缓则治其本
 - B.益火消阴
 - C.开通表里
 - D.通因通用
 - E.虚(则)补其母
- 91.患者,男,42岁。呼吸气促,喉中哮
鸣有声,胸闷如窒,口不渴,形寒肢冷,面色
晦暗,舌苔白滑,脉弦紧。治疗应首选
- A.二陈汤

- B.麻黄汤
- C.定喘汤
- D.射干麻黄汤
- E.平喘固本汤

92.某女,51岁。形肥之人,喘而胸满闷窒,甚则胸盈仰息,痰多色白质黏腻,伴纳呆口黏,苔白厚腻,脉滑。治宜用二陈汤合

- A.平胃散
- B.三子养亲汤
- C.桑杏汤
- D.苏子降气汤
- E.小青龙汤

93.左侧胸部刺痛,固定不移,入夜尤甚,心悸不宁,舌质紫黯,脉沉涩,治疗宜选用

- A.桃仁红花煎
- B.血府逐瘀汤
- C.通窍活血汤
- D.膈下逐瘀汤
- E.桃红四物汤

94.王某,女,46岁。近日洗头后渐出现头痛如裹,肢体困重,纳呆胸闷,小便不利,大便溏泻,苔白腻,脉濡,治则宜

- A.疏散风寒
- B.疏风清热
- C.祛风胜湿
- D.化痰降逆
- E.清热化湿

95.患者突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,两手握固,大小便闭,肢体强痉,伴有静卧不烦,四肢不温,痰涎壅盛,舌苔白腻,脉沉滑缓。其诊断是

- A.中风-阳闭证
- B.中风-阴闭证
- C.中风-脱证
- D.中风-中经络
- E.中风-后遗症

96.患者狂证初发,证见狂乱无知,呼号怒骂,不避亲疏,舌质红绛,苔黄腻,脉弦大滑数。应选方

- A.黄连温胆汤
- B.生铁落饮
- C.龙胆泻肝汤
- D.清营汤
- E.镇肝息风汤

97.患者常轻叫一声,突然跌倒,口吐涎沫或血沫,牙关紧闭,甚则尖叫,短暂即清醒。曾将牙齿咬断,每月平均发作10多次,甚时日发2次,历经中西医治疗效果不佳。平时头昏目眩,大便不畅,痰多,苔薄滑,舌根腻,脉弦滑。属何病

- A.癫病
- B.狂病
- C.郁病
- D.厥病
- E.痫病

98.患者,女,45岁。喉痒干咳三天,无痰,咽喉干痛,鼻唇干燥,伴鼻塞、头痛、微寒、身热,舌质红,少津,苔薄黄,脉浮数。治疗应首选

- A.桑杏汤
- B.桑菊饮
- C.杏苏散
- D.清金化痰汤
- E.沙参麦冬汤

99.男性患者,呕吐吞酸,暖气频繁,胸胁满痛,舌边红,苔薄腻,脉弦。治法宜用

- A.消食化滞,和胃降逆
- B.燥湿祛痰,健脾和胃
- C.舒肝和胃,降逆止呕
- D.温养脾胃,降逆止呕
- E.清肝泻热,降逆止呕

100.许某,男,年过七旬。患病呃逆,呃声急促而不连续,口干舌燥,烦躁不安,舌红而干,脉细数。其治法宜

- A.清胃泻火
- B.养胃生津
- C.泻热和胃
- D.温补脾胃

E.清肝泻火。

101.患者,女,45岁。咳嗽两个月,呈阵发性,咳时面赤,咽干口苦,常感痰滞咽喉而咯之难出,量少质黏,胸胁胀痛,咳时引痛,舌红,苔薄黄,脉弦数。此病症的治法是

- A.燥湿化痰,理气止咳
- B.清肺泻肝,顺气降火
- C.清热肃肺,豁痰止咳
- D.滋阴润肺,化痰止咳
- E.疏风清肺,润燥止咳

102.某患者,下痢2天,现下痢赤白黏冻,腹痛,里急后重,肛门灼热,小便短赤,舌红苔黄腻,脉滑数,首选治疗方剂为

- A.葛根芩连汤
- B.白头翁汤
- C.连理汤
- D.芍药汤
- E.胃苓汤

103.患者大便秘结,欲便不得,暖气频作,胸胁痞满,重则腹中胀痛,纳食减少,舌苔薄腻,脉弦。治疗应首选

- A.四磨汤
- B.五磨饮子
- C.六磨汤
- D.四七汤
- E.柴胡疏肝散

104.患者,男,47岁。右肋下癥块,疼痛如刺,痛处不移,入夜更甚,舌质紫暗,脉沉涩。此证最佳治疗方剂是

- A.硝石矾石散
- B.丹参饮合失笑散
- C.复元活血汤
- D.少腹逐瘀汤
- E.柴胡疏肝散

105.患者,女,50岁。证见积块坚硬,疼痛渐重,面色黧黑,肌肉瘦削,饮食锐减,舌淡紫,无苔,脉弦细。其治法为

- A.理气活血,通络消积
- B.理气活血,软坚散结

C.理气活血,祛瘀软坚

- D.大补气血,活血化瘀
- E.通滞去积,活血化瘀

106.患者排尿点滴不通,烦渴欲饮,咽干,呼吸短促,咳嗽,舌苔薄黄,脉数。其治法是

- A.行瘀散结,通利水道
- B.疏调气机,通利小便
- C.清泻肺热,通利水道
- D.清热利湿,通利小便
- E.升清降浊,化气利水

107.患者,男,29岁。腕闷不舒,纳呆恶心,时吐痰涎,头晕目眩,苔白滑,脉滑,临床诊断最可能是

- A.饮停于胃证
- B.痰阻于胃证
- C.痰迷心窍证
- D.痰停经络证
- E.饮停胸胁证

108.患者,女,48岁。时常汗出,恶风,易于感冒,体倦乏力,周身酸楚,时寒时热,舌苔薄白,脉缓。其治法是

- A.益气固表
- B.调和营卫
- C.滋阴降火
- D.清肝泄热
- E.益气化湿

109.患者,男,60岁。咳嗽1个月,劳累后加重,咯吐黏痰,胸脘痞闷,胃纳减少,舌苔白腻,脉濡滑。治疗除取肺俞、太渊外,还应加

- A.风门、大椎、合谷
- B.章门、太白、丰隆
- C.脾俞、胃俞、列缺
- D.尺泽、列缺、外关
- E.脾俞、太冲、行间

110.刘某,男,68岁。突然神昏,半身不遂,目合口张,遗溺,四肢逆冷,脉象细弱。针灸取穴应该为

- A.水沟、丰隆、劳宫、十二井穴
- B.风池、心俞、肾俞、四神聪
- C.关元、神阙并配合艾灸
- D.风池、合谷、足三里、三阴交
- E.合谷、太冲、地仓、颊车、命门

111.按对应顺序,耳门、听宫、听会所属的经脉分别是

- A.胆经、三焦经、小肠经
- B.三焦经、胆经、小肠经
- C.胆经、小肠经、三焦经
- D.三焦经、小肠经、胆经
- E.小肠经、胆经、三焦经

112.范某,男,68岁。三年来小便淋沥不爽,排尿无力,面色白,神气怯弱,腰膝酸软,舌质淡,脉沉细尺弱。针灸取穴应主取

- A.任脉、足太阳膀胱经
- B.足少阴肾经、足太阳膀胱经
- C.足太阳膀胱经、手太阴肺经
- D.足少阴肾经、手少阳三焦经
- E.足少阴肾经、手太阴肺经

113.何某,女,37岁。突然暴病耳聋,鸣声高亢,兼畏寒发热,舌淡红苔薄,脉浮数。针灸取穴除局部腧穴外,可配取

- A.侠溪、中渚、太冲、丘墟
- B.侠溪、中渚、肾俞、关元
- C.侠溪、中渚、外关、合谷
- D.侠溪、中渚、太溪、太冲
- E.侠溪、中渚、内关、神门

114.温某,女,50岁。半年来面目、下肢时有浮肿。气色晦滞,小便清利,大便溏泄,喜暖畏寒,脉沉细,舌淡苔白。针灸取穴为

- A.水分、三焦俞、气海、肺俞、合谷
- B.水分、三焦俞、气海、脾俞、阴陵泉
- C.脾俞、胃俞、足三里、太白
- D.肺俞、脾俞、合谷、足三里
- E.以上都不是

115.患者,男,63岁。头晕目眩,甚则昏眩欲仆,伴耳鸣,腰膝酸软,遗精,舌淡,脉沉细。除风池、百会外,应加用

- A.内关、太冲、行间、侠溪、太溪
- B.内关、太冲、头维、丰隆、中腕
- C.肝俞、肾俞、足三里、脾俞、胃俞
- D.肝俞、肾俞、足三里、太溪、三阴交
- E.头维、血海、膈俞、内关、太溪

116.患者便次增多,便中带有黏液脓血,腹痛,里急后重。治疗应选用的腧穴是

- A.天枢、上巨虚、合谷、三阴交
- B.中腕、气海、大横、曲池、足三里
- C.内关、中腕、足三里、三阴交
- D.天枢、上巨虚、内庭、足三里
- E.天枢、大肠俞、脾俞、肾俞

117.患者,女,20岁。食海鲜后皮肤出现大小不等、形状不一的风团,高起皮肤,边界清楚,色红,瘙痒,伴恶心,肠鸣泄泻,舌红,苔黄腻,脉滑数。除曲池、合谷、血海、膈俞、委中外,还应加取的腧穴是

- A.外关、风池
- B.足三里、天枢
- C.三阴交、天枢
- D.足三里、脾俞
- E.三阴交、风池

118.患者,男,24岁。头痛,以前额为主,阵阵发作,每遇风吹、受寒时疼痛加重,痛如锥刺,舌苔薄白,脉弦。治疗应首选

- A.上星、头维、合谷、阿是穴
- B.百会、通天、太冲、阿是穴
- C.神庭、百会、风池、阿是穴
- D.头临泣、率谷、风池、阿是穴
- E.上星、前顶、风池、阿是穴

119.根据俞募配穴法,治疗胃痛应选用

- A.中腕、足三里
- B.太冲、三阴交
- C.中腕、胃俞
- D.中腕、脾俞
- E.章门、胃俞

120.赵某,女,46岁。带下半年,色白质稀,气腥,伴神倦体乏,食欲不振,脉迟濡,苔白滑。针灸治疗,主穴应该选取

- A. 足临泣、行间、阴陵泉、三阴交
- B. 三阴交、带脉、白环俞、中极
- C. 白环俞、带脉、三阴交、气海、行间

- D. 白环俞、志室、肝俞、三阴交
- E. 足三里、三阴交、关元

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(121~122 题共用备选答案)

- A. 咳声重浊
- B. 咳声清脆
- C. 咳声顿作
- D. 咳声如犬吠
- E. 咳声不扬

121. 外感风寒多见

122. 白喉多见

(123~124 题共用备选答案)

- A. 三子养亲汤
- B. 理中丸
- C. 归脾丸
- D. 六君子汤
- E. 补中益气汤

123. 哮喘缓解期脾虚型首选

124. 哮喘证属风痰者,应首选

(125~126 题共用备选答案)

- A. 保真汤
- B. 月华丸
- C. 八珍汤
- D. 补天大造丸
- E. 补肺汤

125. 肺癆之气阴耗伤证最佳方剂为

126. 肺癆之阴阳两虚证最佳方剂为

(127~128 题共用备选答案)

- A. 冲脉
- B. 督脉
- C. 阴跷脉
- D. 阴维脉

E. 任脉

127. 具有调节全身阴经经气作用的是

128. 具有调节六阴经经气作用的是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 血府逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 旋覆花汤
- E. 失笑散合丹参饮

129. 瘀血停胃型胃痛主方是

130. 瘀血内停型腹痛主方是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 香苏饮
- B. 胃苓汤
- C. 羌活胜湿汤
- D. 参苓白术散
- E. 藿香正气散

131. 外感风寒而致呕吐的治疗宜选用

132. 外感寒湿而致泄泻的治疗宜选用

(133~134 题共用备选答案)

- A. 大便清稀,完谷不化,腹部喜温
- B. 大便色黄褐而臭,泻下急迫,肛门灼热
- C. 泻下腹痛,痛势急迫拒按,泻后痛减
- D. 大便时溏时泻,完谷不化,腹痛不甚,喜温喜按
- E. 每因抑郁恼怒或情绪紧张时,即发生腹痛泄泻

133. 寒证泄泻的特征是

134.虚证泄泻的特征是

(135~136 题共用备选答案)

- A.茵陈蒿汤
- B.茵陈术附汤
- C.茵陈五苓散
- D.犀角散
- E.逍遥散

135.治疗阳黄热重于湿的主方为

136.治疗阳黄湿重于热的主方为

(137~138 题共用备选答案)

- A.玉女煎
- B.龙胆泻肝汤
- C.泻白散合黛蛤散
- D.泻心汤合十灰散
- E.加味清胃散合泻心汤

137.治疗吐血胃热壅盛证,应首选

138.治疗鼻衄胃热炽盛证,应首选

(139~140 题共用备选答案)

- A.四妙丸
- B.加味二妙散
- C.肾着汤
- D.肾气丸
- E.左归丸

139.湿热腰痛,可选用

140.湿热浸淫痿证,可选用

(141~142 题共用备选答案)

- A.12 寸
- B.13 寸
- C.16 寸
- D.18 寸
- E.19 寸

141.耻骨联合上缘至髌底的骨度分寸是

142.膈横纹至外踝尖的骨度分寸是

(143~144 题共用备选答案)

A.合谷、内关

B.太冲、太溪

C.上星、头维

D.百会、通天

E.风门、列缺

143.治疗头痛肝阳上亢证,应选

144.治疗头痛外感风寒证,应选

(145~146 题共用备选答案)

- A.足太阴脾经
- B.足阳明胃经
- C.手少阴心经
- D.足少阴肾经
- E.手太阴肺经

145.其直者,从肾上贯肝膈,入肺中,循喉咙,夹舌本的经脉是

146.上膈,夹咽,连舌本,散舌下的经脉是

(147~148 题共用备选答案)

- A.第 7 胸椎
- B.第 12 胸椎
- C.第 2 腰椎
- D.第 4 腰椎
- E.第 10 胸椎

147.一般临床取穴,肩胛骨下角相当

148.一般临床取穴,髂嵴相当

(149~150 题共用备选答案)

- A.三棱针腧穴点刺
- B.三棱针刺络
- C.三棱针散刺
- D.皮肤针循经叩刺
- E.皮内针埋针

149.用三棱针治中暑时多选用

150.治疗顽癣时多选用

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	E	E	D	D	B	A	B	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	E	B	E	E	E	B	E	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	D	D	D	A	E	C	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	D	D	D	D	B	E	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	E	E	C	D	B	D	A	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	E	C	C	C	D	C	A	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	D	B	B	C	A	C	B	C	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	B	B	B	D	E	B	A	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	E	A	B	C	B	C	C	D	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	B	C	B	B	E	A	C	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	D	C	C	D	C	A	A	B	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	A	C	B	D	A	B	A	C	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	D	D	A	A	D	E	D	E	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	E	A	D	A	C	D	C	A	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
D	C	B	E	D	A	A	D	B	C

第四单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 外科疾病辨证的总纲是

- A. 脏腑
- B. 经络
- C. 气血
- D. 阴阳
- E. 局部

2. 属于多血多气之经者为

- A. 手、足阳明经
- B. 手、足太阳经
- C. 手、足厥阴经
- D. 手、足少阳经
- E. 手、足太阴经

3. 下列哪一项不属于疔的特点

- A. 色红、灼热、疼痛
- B. 突起根浅
- C. 肿势局限
- D. 范围多在 2 cm 以下
- E. 易脓、易溃、易敛

4. 下列哪种疔疮最易发生走黄

- A. 颧疔
- B. 蛇眼疔
- C. 蛇头疔
- D. 蛇腹疔
- E. 托盘疔

5. 外科内治法的具体治法哪项不正确

- A. 解表、清热、通里
- B. 温通、祛痰、理湿
- C. 行气、和营、内托
- D. 消肿、提脓、去肌
- E. 补益、养胃

6. 下列各项中,需用砭镰法治疗的是

- A. 托盘疔
- B. 颜面部疔
- C. 红丝疔
- D. 蛇眼疔
- E. 蛙节疔

7. 乳腺检查的正确顺序是

- A. 内上、外上、外下、内下、中央、腋窝及锁骨区
- B. 外上、外下、内上、内下、中央、腋窝及锁骨区
- C. 中央、内下、内上、外上、外下、腋窝及锁骨区
- D. 外上、内上、外下、外上、中央、腋窝及锁骨区
- E. 中央、腋窝及锁骨区、外上、内上、外下、外上

8. 下列除哪项外,都可以作为临床诊断乳腺癌的依据

- A. 乳房内肿块,坚硬,高低不平
- B. 乳房内肿块,乳头回缩或抬高
- C. 乳房内肿块,乳房皮肤呈橘皮样改变
- D. 乳房内肿块,伴同侧腋窝淋巴结肿大
- E. 乳头有溢液或溢血

9. 以下哪项不是瘰疬的病机

- A. 气滞
- B. 血瘀
- C. 痰凝
- D. 血虚风燥
- E. 痰火郁结

10. 以下哪项不是肉瘻的特点
- 如肉之团
 - 发展缓慢
 - 柔韧而圆
 - 漫肿质软
 - 结喉一侧或两侧结块
11. 下列各项, 不属于瘰疬特征的是
- 颈中两侧结块
 - 皮色不变
 - 微有灼热
 - 疼痛牵引至耳后枕部
 - 容易化脓
12. 石瘻应首选的治疗原则是
- 早期, 中药外敷
 - 早期, 中药内治
 - 早期, 手术切除
 - 早期, 化学治疗
 - 早期, 放射治疗
13. 流注的病因是下列
- 恣食膏粱厚味
 - 内郁湿火, 外感风邪
 - 跌打损伤, 瘀血停留
 - 皮肤外伤感染毒邪
 - 患丹痧、麻疹之后, 体虚余毒未清
14. 治疗鼠乳常用
- 挤疣疗法
 - 内服中药
 - 手术挖除
 - 结扎疗法
 - 针灸疗法
15. 白秃疮的特点是
- 相当于西医的黄癣
 - 多见于青年人, 男性多于女性
 - 头发易拔落而且不痛, 病发根部包绕有白色鳞屑形成的菌鞘
 - 癣痂呈蜡黄色、肥厚, 有特殊的鼠尿臭
 - 当病愈后头皮留下萎缩性瘢痕
16. 牛皮癣(中医)的典型皮疹为
- 皮疹色鲜红
 - 扁平多角形丘疹, 融合成片呈苔藓样
 - 严重时汁水淋漓
 - 皮疹为红色丘疹、丘疱疹、脓疱
 - 皮损经搔抓脱屑后基底可见点状出血
17. 下列关于肛门直肠疾病好发部位的叙述, 错误的是
- 内痔好发于截石位 3、7、11 点
 - 赘皮外痔好发于截石位 6、12 点
 - 血栓外痔好发于截石位 3、9 点
 - 肛裂好发于截石位 3、9 点
 - 混合痔好发于截石位 3、7、11 点
18. 肛瘻手术成败的关键是
- 切除瘻管
 - 引流通畅
 - 将外口与瘻管切除
 - 找到内口并切除
 - 不要损伤括约肌
19. 肛管直肠癌的早期症状除便血外, 还可见
- 粪便变形
 - 腹胀肠鸣
 - 脱出不纳
 - 排便习惯改变
 - 肛门潮湿
20. 陈旧肛裂伴有肛门狭窄时最佳治疗方法为
- 内服凉血地黄汤
 - 生肌玉红膏外敷
 - 封闭疗法
 - 扩肛法
 - 纵切横缝法
21. 精癯患者直肠指诊前列腺的特征下列哪一项不符
- 表面光滑而无结节
 - 边缘清楚
 - 中等硬度而富有弹性
 - 中央沟变浅或消失
 - 压痛明显
22. 睾丸及附睾的急性化脓性感染称为

- A.子痰
B.囊痈
C.子痈
D.脱囊
E.卵子瘟
- 23.深静脉血栓形成的最大危险性是
A.水肿
B.肺栓塞
C.下肢坏死
D.患肢增粗
E.浅静脉扩张
- 24.疔疮形成的主要原因是
A.长期站立负重
B.虫咬
C.局部皮肤破损
D.湿疹及过敏性皮炎
E.外伤
- 25.疔疮的病因病机是
A.久病气血亏虚,不能营养肌肤
B.气血失和,经脉阻滞,气血凝结
C.湿热下注,瘀血凝滞经络
D.气血失和,风寒痰浊凝聚
E.寒湿凝聚经络,闭塞不通,气血运行不畅
- 26.最典型的神经毒类毒蛇有
A.眼镜蛇
B.眼镜王蛇
C.蝮蛇
D.烙铁头蛇
E.银环蛇
- 27.下列哪项不是“天癸”成熟的条件
A.肾气充盛
B.脾气健旺
C.年已 18 岁
D.精血充实
E.肾阴充盛
- 28.与月经产生没有直接关系的脏腑是
A.肾
B.肺
C.胆
D.脾
E.胃
- 29.妊娠足月,胎位下移,腰腹阵痛,有便意或“见红”者,是
A.临产
B.试胎
C.弄胎
D.分娩
E.激经
- 30.月经先后无定期的主要发病机理是
A.寒凝血瘀,冲任不畅
B.气虚统摄无权
C.水亏火旺,热扰冲任
D.痰阻经脉,血行不畅
E.气血失于调节,血海蓄溢失常
- 31.同起于胞中的三条经脉是
A.冲、任、带
B.冲、督、带
C.冲、任、督
D.任、督、带
E.冲、任、跷
- 32.下列各项,属寒邪导致的妇科疾病是
A.子淋
B.痛经
C.经行吐衄
D.崩漏
E.月经先期
- 33.产后“三病”是指
A.呕吐、泄泻、盗汗
B.尿失禁、缺乳、大便难
C.血晕、发热、痉证
D.病痉、病郁冒、大便难
E.腹痛、恶露不下、发热
- 34.治疗月经先期阳盛血热证,应首选
A.清经散
B.逍遥散
C.当归芍药散
D.导赤散
E.柴胡疏肝散
- 35.桂枝茯苓丸的组成是

- A. 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、红花
 B. 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、桃仁
 C. 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、牛膝
 D. 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、丹参
 E. 桂枝、茯苓、丹皮、芍药、莪术
36. 月经过少肾虚证的治法是
 A. 补肾益精, 养血调经
 B. 补肾益精, 活血调经
 C. 温肾健脾, 养血调经
 D. 温肾健脾, 活血调经
 E. 温肾健脾, 疏肝调经
37. 崩漏实热证的治法是
 A. 养阴清热, 凉血止血
 B. 清热泻火, 固冲止血
 C. 养阴化瘀, 凉血止血
 D. 清热化瘀, 凉血止血
 E. 清热凉血, 固冲止血
38. 经行吐衄的发病机制主要是
 A. 血热冲气上逆
 B. 脾虚不能统血
 C. 肝郁化热, 迫血妄行
 D. 肺肾阴虚, 虚火伤络
 E. 瘀血阻络, 新血不归
39. 肝胃不和型恶阻的特征是
 A. 呕吐酸腐
 B. 呕吐痰涎
 C. 呕吐清涎
 D. 呕吐酸水或苦水
 E. 口中泛酸
40. 异位妊娠, 未破损期治疗方法为
 A. 活血化瘀, 消癥杀胚
 B. 活血化瘀, 消癥散结
 C. 益气摄血, 佐以止痛
 D. 行气活血, 化瘀止痛
 E. 凉血养血, 佐以止痛
41. 止带方适用于带下病的哪种证候
 A. 肾阳虚
 B. 肾阴虚
 C. 脾虚
 D. 湿热

- E. 湿毒
42. 带下过多热毒蕴结证的带下特点是
 A. 带下如涕如唾, 色淡黄, 质稀薄
 B. 带下色淡黄, 有气味
 C. 带下赤白难闻, 质稠, 有气味
 D. 带下色白质黏, 呈豆渣样
 E. 带下黄绿如脓, 质黏腻, 臭秽难闻
43. 产后病的主要病理特点是
 A. 气血虚弱
 B. 阴虚血热
 C. 多虚多瘀
 D. 寒热并见
 E. 气机郁滞
44. 治疗肝郁不孕宜首选
 A. 毓麟珠
 B. 启宫丸
 C. 养精种玉汤
 D. 开郁种玉汤
 E. 温胞饮
45. 闭经的治疗原则是
 A. 急则治其标, 缓则治其本
 B. 活血化瘀, 理气通经
 C. 滋肾益肾, 活血通经
 D. 益气养血, 补肾通经
 E. 虚者补而通之, 实者泻而通之
46. 痛经气滞血瘀证的腹痛特点是
 A. 冷痛拒按
 B. 灼痛不适
 C. 隐隐作痛
 D. 胀痛拒按
 E. 绵绵作痛
47. 小儿的病理特点是
 A. 脾常不足
 B. 肝常有余
 C. 稚阳未充、稚阴未长
 D. 易虚易实
 E. 发病容易, 传变迅速, 脏气清灵, 易趋康复
48. 下列小儿动作发育规律中哪一项是错误的

- A. 头尾规律
B. 远近规律
C. 左右规律
D. 由不协调到协调
E. 由粗动作到精细动作
49. 小儿翻滚不安, 呼叫哭吵, 两手捧腹多为
- A. 惊风
B. 腹痛
C. 伤食
D. 饥饿
E. 积滞
50. 在辨斑疹中, 下列哪项不是“斑”的特点
- A. 大小不一
B. 片状或点状
C. 红色或紫色
D. 不高出皮肤
E. 压之退色
51. 小儿易产生感冒、咳喘, 原因主要是
- A. 脾常不足
B. 肺脏娇嫩
C. 肾常虚
D. 稚阳未充
E. 稚阴未长
52. “纯阳”学说是指小儿
- A. 发育迅速
B. 脏腑娇嫩
C. 有阳无阴
D. 阳亢阴亏
E. 形气未充
53. 治疗鹅口疮心脾积热型的首选方剂是
- A. 清胃散
B. 泻黄散
C. 导赤散
D. 清热泻脾散
E. 凉膈散
54. “疳气”病儿易发脾气是由于
- A. 土虚木旺

- B. 肝气郁结
C. 肝火太旺
D. 心神不宁
E. 以上都不是
55. 风痧的病变部位主要在
- A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
56. 治疗小儿紫癜血热妄行型首选方剂是
- A. 犀角地黄汤
B. 清营汤
C. 化斑解毒汤
D. 玉女煎
E. 清宫汤
57. 疔腮的病因是感受
- A. 风热时邪
B. 时行疫气
C. 时行邪毒
D. 风热邪毒
E. 暑热时邪
58. 小儿中药用量, 幼儿及幼童应为
- A. 成人量 1/6
B. 成人量 1/3
C. 成人量 1/2
D. 成人量 2/3
E. 成人量
59. 刺四缝疗法, 常用于治疗
- A. 婴儿泄泻
B. 呕吐
C. 腹痛
D. 疳证
E. 积滞
60. 治疗寒性哮喘, 首选方剂为
- A. 小青龙汤合三子养亲汤
B. 定喘汤
C. 华盖散
D. 小青龙汤合黑锡丹

E.射干麻黄汤

61.鹅口疮好发于

A.新生儿

B.婴儿

C.学龄前儿童

D.学龄儿童

E.青春期儿童

62.泄泻的病变脏腑主要是

A.肝、胆

B.心、小肠

C.脾、胃

D.肺、大肠

E.肾、膀胱

63.小儿厌食证的主要病理是

A.脾胃不和

B.脾虚夹积

C.乳食积滞

D.中阳不足

E.脾虚肝郁

64.下列哪项不是疳证的主要临床表现

A.腹部隐痛

B.饮食异常

C.腹部胀大

D.头发稀疏

E.形体羸瘦

65.下列哪项不是急惊风的治疗原则

A.豁痰

B.息风

C.镇惊

D.醒神

E.清热

66.下列哪项不属急惊风四证

A.痰

B.热

C.湿

D.风

E.惊

67.紫癜实证早期治宜

A.活血化瘀

B.疏风清热

C.补气摄血

D.养阴清热

E.清热凉血

68.确定一种传染病的检疫期限是根据该病的

A.最长潜伏期

B.平均潜伏期

C.最短潜伏期

D.恢复期

E.前驱期

69.保护易感人群采用的最重要措施是

A.使用转移因子等免疫激活剂

B.预防性使用抗生素

C.使用高价免疫球蛋白

D.接种疫苗、菌苗或类毒素等

E.增加营养

70.反映 HBV 感染最直接、特异的指标是

A.HBsAg

B.HBeAg

C.HBeAg

D.DNA 多聚酶

E.HBV-DNA

71.流行性出血热又称为

A.出血热肺综合征

B.肾综合征出血热

C.新疆出血热

D.阿根廷出血热

E.登革热出血热

72.流行性出血热的三大主症是

A.出血,休克,肾损害

B.发热,休克,少尿

C.发热,出血,肾损害

D.发热,出血,皮疹

E.休克,少尿,出血

73.艾滋病病毒感染的窗口期是指

A.从艾滋病病毒感染后到血清中检出 HIV-RNA

B.从艾滋病病毒感染后到血清中检出 p24 抗原

C.从艾滋病病毒感染后到血清中检出CD4⁺T淋巴细胞数下降

D.从艾滋病病毒感染后到血清中检出HIV抗体

E.从艾滋病病毒感染后到典型临床症状出现

74.目前预防艾滋病最重要的措施是

A.及时隔离 HIV 感染者

B.充分理解和关心艾滋病患者,以免其隐瞒病情

C.提高公众意识,切断传播途径

D.易感者接种 HIV 疫苗

E.应用高效价免疫球蛋白保护易感者

75.传染性非典型肺炎最主要的传播途径是

A.飞沫传播

B.接触传播

C.果子狸等野生动物传播

D.消化道排泄物传播

E.损伤皮肤受染

76.流行性感冒的主要治疗措施不包括

A.休息

B.抗菌治疗

C.解热镇痛及支持治疗

D.呼吸道隔离

E.金刚烷胺抗病毒治疗

77.狂犬病毒亲和力最大的是

A.神经组织

B.结缔组织

C.平滑肌

D.皮肤和黏膜

E.骨骼肌

78.目前我国治疗普通型流脑首选的药物是

A.青霉素

B.氯霉素

C.头孢类抗生素

D.磺胺类

E.环丙沙星

79.伤寒杆菌的主要致病因素是

A.外毒素

B.肠毒素

C.内毒素

D.H 抗原

E.O 抗原

80.目前治疗伤寒的首选药物是

A.头孢菌素

B.氯霉素

C.喹诺酮类

D.庆大霉素

E.氨苄西林

81.霍乱最重要的传播途径是

A.食物传播

B.生活接触

C.苍蝇媒介

D.水型传播

E.带菌动物传播

82.霍乱的治疗过程中,首选的抗生素为

A.氯霉素

B.多西环素

C.四环素

D.氨苄西林

E.卡那霉素

83.伤寒的典型临床症状为

A.持续发热,相对缓脉,消化道症状,玫瑰疹,肝脾大及白细胞减少

B.持续发热,肝大,血疹,脉速,白细胞减少

C.弛张热,脾大,水晶汗疹,相对缓脉,白细胞增多

D.不规则发热,脾大,玫瑰疹,重脉,白细胞减少

E.不规则发热,脾大,玫瑰疹,重脉,白细胞增多

A2 型题

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

84.某男,36岁。颈旁结块1周,红肿热痛,恶寒发热,头痛,口干,咽痛,舌红苔薄黄,脉浮数。诊断颈痈,治宜

- A.清热解毒,消肿止痛
- B.散风清热,化痰消肿
- C.清热凉血,解毒止痛
- D.活血凉血,疏血止痛
- E.清热通腑,消肿止痛

85.患者,男,18岁。两乳内发现疼痛性肿物1周,检查:肿物大小约3 cm×3 cm×1 cm,质地中等,有压痛,位于乳晕中央,界限清楚,可移动。应首先考虑的是

- A.乳癖
- B.乳痈
- C.乳疔
- D.乳岩
- E.乳腺增生病

86.患者,女,26岁。产后第三周出现恶寒发热,右乳肿胀疼痛,体温38.7℃,体检见乳房肿大,皮色微红,无波动感。治宜

- A.切开引流
- B.舒肝理气,化痰散结
- C.疏肝清热,通乳消肿
- D.清热解毒,托里透脓
- E.泻火解毒利湿

87.头发突然成片脱落,脱发区头皮光滑而亮,为

- A.油风
- B.白秃疮
- C.白屑风
- D.肥疮
- E.面游风

88.患者3天来全身起红色风团,灼热剧痒,遇热时皮疹加重,苔薄黄,脉浮数。治疗方剂宜选用

- A.桂枝汤

- B.麻黄汤
- C.消风散
- D.麻桂各半汤
- E.当归饮子

89.一患儿,男,6岁。排便时肛门脱出一肿物,呈环形,色鲜红,便后自行回纳,有时伴有点滴出血,多染于便纸上。最可能的诊断是

- A.内痔脱出
- B.息肉脱出
- C.完全性直肠脱垂
- D.直肠黏膜脱垂
- E.以上均非

90.患者,女性,36岁。平时大便干燥,近来便秘时肛门疼痛,便后持续半小时疼痛方逐渐缓解,大便后手纸带有鲜血。该患者应首先考虑的诊断是

- A.炎性外痔
- B.肛裂
- C.血栓外痔
- D.肛窦炎
- E.肛周脓肿

91.患者,男,47岁。尿道中有白色分泌物滴出3年,劳累后更为明显,伴腰膝酸冷,放射至会阴部,形寒肢冷,精神不振,头晕。治疗应首选

- A.龙胆泻肝丸
- B.知柏地黄丸
- C.左归丸
- D.济生肾气丸
- E.独活寄生汤

92.患者,男,76岁。进行性排尿困难2年。症见小便不畅,尿线变细,小腹胀满隐痛,偶有血尿,舌质暗苔白,脉弦。治疗应选

- A.补中益气汤
- B.济生肾气丸

- C.知柏地黄丸
D.沉香散
E.八正散
- 93.患者,女,33岁。婚后3年未避孕,未孕(已排除丈夫因素),体型肥胖,月经经常延后,带下量多,色白,质黏稠,面目虚浮,胸闷泛恶,舌淡胖,苔白腻,脉滑。其证是
- A.瘀滞胞宫证
B.肝郁脾虚证
C.痰湿内阻证
D.脾肾阳虚证
E.肝肾亏虚证
- 94.患者,女,38岁,已婚。近半年月经时而提前10天,时而延后2周,经量时多时少,色暗红,经行不畅,经行乳房胀痛,脘闷不舒,时叹息,苔薄白,脉弦。其证是
- A.肝郁证
B.肝郁肾虚证
C.血瘀证
D.肝郁脾虚证
E.肾虚证
- 95.患者,女,27岁,未婚。近半年来常感小腹冷痛,经行腹痛加重,得热痛减,经行错后,经血量少,色暗有瘀块,面色青白,肢冷畏寒,舌暗红,苔白,脉沉紧。治疗应首选的方剂是
- A.膈下逐瘀汤
B.少腹逐瘀汤
C.银甲丸
D.理冲汤
E.温经汤
- 96.证见经后小腹隐痛,小腹空坠喜按,月经量少色淡,神疲乏力,面色不华,舌淡,脉细弱。首选方剂是
- A.圣愈汤
B.四物汤
C.人参养荣汤
D.滋血汤
E.当归补血汤
- 97.患者,女,13岁。今年6月月经初潮,量偏多,现停经4个月未行经,带下偏多,质稀透明,余无明显不适。诊断为
- A.月经后期
B.继发性闭经
C.原发性闭经
D.带下病
E.以上均非
- 98.患者,女,带下量多,赤白相兼,无臭味,阴部灼热,头晕目眩,五心烦热,失眠多梦。舌红少苔,脉细数。治疗应首选
- A.完带汤
B.易黄汤
C.五味消毒饮
D.知柏地黄汤
E.止带方
- 99.患者,女,35岁,已婚。月经后期,40~50天1行,量少、色暗、时有血块,小腹较胀,胸胁乳房胀痛,舌略暗苔薄,脉弦。其证候是
- A.血寒
B.血虚
C.肾虚
D.气滞
E.血瘀
- 100.患者,女,30岁,已婚。月经25天一行,经来量多,色深红,质稠,有血块,口渴心烦。治疗应首选的方剂是
- A.安冲汤
B.保阴煎
C.两地汤
D.解毒四物汤
E.清热固经汤
- 101.患者,女,22岁,未婚。月经2~3个月一行,量少色淡,质清稀,时有小腹冷痛,喜热喜按,伴有面色少华,小便清长,便溏,腰酸乏力,四肢欠温,舌淡,苔白,脉沉迟。治疗应首选的方剂是
- A.八珍益母丸
B.十全大补丸
C.艾附暖宫丸

D.大补元煎

E.肾气丸

102.患者每于经期即出现寒热往来,胸胁苦满,口苦咽干,心烦欲呕,头晕目眩,默默不欲饮食,舌红,苔薄白,脉弦。治疗应首选的方剂是

A.一贯煎

B.小柴胡汤

C.丹栀逍遥散

D.柴胡疏肝散

E.四逆散

103.某男婴,6个月。近两天见口腔黏膜白屑散在。患儿形体怯弱,面白颧红,五心烦热,口干不渴,或低热盗汗等,舌质红,少苔。治疗首选方剂是

A.一贯煎

B.玉女煎

C.知柏地黄汤

D.沙参麦冬汤

E.六味地黄汤加肉桂

104.患儿,女,1岁。腹泻1天入院,泄泻清稀,中多泡沫,臭气不甚,肠鸣腹痛,兼有恶寒发热,舌苔白滑。其治疗首选方剂是

A.荆防败毒散

B.藿香正气散

C.胃苓汤

D.理中汤

E.参苓白术散

105.患儿,女,9个月。面色萎黄,困倦无力,夜睡不安,不思饮食,食则饱胀,腹满喜按,呕吐酸馊乳食,大便溏薄酸臭,唇舌色淡,舌苔白腻,脉沉细而滑,指纹青淡。治疗首选方剂是

A.健脾丸

B.理中丸

C.枳术丸

D.香砂六君子

E.保和丸

106.患儿,男,5岁。经常梦中遗尿,睡眠不安,白天多动,较少安静,手足心热,舌

红,苔薄少津,脉沉细而数。治疗应首选的方剂是

A.知柏地黄丸

B.交泰丸合导赤散

C.缩尿丸

D.导赤散

E.五子衍宗丸

107.患儿,4岁。两日来发热不退,咳喘痰黄,声高息涌,呼气延长。其证候是

A.风热咳嗽

B.痰热咳嗽

C.痰热闭肺

D.风热闭肺

E.热性哮喘

108.患儿,男,8岁。口腔溃疡经常发生,但疼痛不甚,口干不渴,神疲乏力。查:口腔内2处溃疡,色淡,舌淡红苔少,脉细数。此病例所选方药为

A.凉膈散

B.泻心导赤散

C.六味地黄丸

D.养阴生肌散

E.沙参麦冬汤

109.患儿,男,4岁。症见形体略消瘦,面色萎黄少华,毛发稍稀,食欲不振,精神欠佳,易发脾气,大便溏,舌苔薄微黄,治疗首选方是

A.资生健脾丸

B.参苓白术散

C.肥儿丸

D.香砂六君子汤

E.以上都不是

110.男性,40岁。发热1周,伴乏力、食欲减退、恶心。尿黄,黄疸迅速加重,3天来神志恍惚。化验:ALT 180 U/L, TBIL 200 μmol/L, 胆固醇 3.5 mmol/L。为确诊最重要的检查是

A.肝炎病毒标志物

B.AFP

C.血浆白蛋白

D.PTA

E.ALP

111.男性患者,38岁。3天来发热,伴畏寒、头痛、眼痛、腰痛入院。T 38.6℃,眼结膜充血水肿,面部潮红,两肋部有小出血点。血WBC $16 \times 10^9/L$,尿蛋白(+++)。为确诊应做哪项检查

A.脑脊液检查

B.血培养

C.钩端螺旋体病凝溶试验

D.尿培养

E.流行性出血热特异性抗体

112.女,25岁。近2周来乏力、低热、咳嗽、全身不适,食欲差且体重下降。有不洁性生活史。体检:T 37.3℃,颈部、腋下淋巴结肿大,质软,无压痛。首先应做什么检查

A.CD4⁺T淋巴细胞和总淋巴细胞计数

B.外斐反应

C.CT检查

D.结核菌素试验

E.抗HIV检测

113.女婴6个月,发热3天,T 39℃,烦躁、拒食、吐奶伴腹泻,于12月20日入院。体检:T 40℃,神清,烦躁不安,皮肤散在出血

点,颈抵抗(-),布氏征(-),前囟突出。血WBC $17.6 \times 10^9/L$,中性粒细胞87%,淋巴细胞13%。腰穿脑脊液检查:压力310 mmH₂O, WBC $1360 \times 10^6/L$,多核细胞85%,单核细胞15%,蛋白3.5 g/L,糖1.6 μmol/L,氯化物89 μmol/L,便常规检查未见异常。最可能的诊断是

A.中毒性痢疾

B.结核性脑膜炎

C.败血症休克

D.流行性脑脊髓膜炎

E.流行性乙型脑炎

114.男性,40岁。因低热、腹泻1个月入院,每日排果酱样便2~3次。体检:T 37.8℃, BP 125/75 mmHg,消瘦。心肺(-),腹软,肝脾未及。右下腹压痛(+),反跳痛(-)。化验:血WBC $75 \times 10^9/L$,淋巴细胞25%,中性粒细胞75%。粪便镜检WBC 10/Hp, RBC满视野。最可能的诊断是

A.急性肠炎

B.阿米巴痢疾

C.霍乱

D.急性细菌性痢疾普通型

E.慢性细菌性痢疾

B1型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(115~116题共用备选答案)

A.火

B.寒

C.湿

D.痰

E.瘀血

115.肿势或软如棉,或硬如结核,不红不热,多因

116.肿而不硬,皮色不泽,皮肤清冷,得

暖则舒,多因

(117~118题共用备选答案)

A.初起有多个粟粒状脓头

B.初起光软无头,红肿疼痛,范围6~9 cm

C.初起疮形如粟粒状脓头,坚硬根深

D.初起皮肤片状红斑,边界清楚,压之褪色,抬手即复

E.初起疮形如粟,突起根浅

117.有头疽的特征

118.疔疮的特征

(119~120 题共用备选答案)

A.疔疮(硬下疳)

B.杨梅疮

C.横痃

D.小儿遗毒(胎传梅毒)

E.杨梅结毒

119.患儿前额圆凸,桑椹齿、马鞍鼻,口周皮肤有放射状皱纹,是什么病的永久性标记

120.一期梅毒伴随皮损而发的腹股沟淋巴结肿大称为

(121~122 题共用备选答案)

A.100~150 mL/kg

B.150~200 mL/kg

C.50~120 mL/kg

D.60~80 mL/kg

E.200~250 mL/kg

121.儿童轻型霍乱患者 24 小时补液量为

122.儿童重型霍乱患者 24 小时补液量为

(123~124 题共用备选答案)

A.知柏地黄汤

B.清肝止淋汤

C.两地汤

D.解毒活血汤

E.逐瘀止血汤

123.经间期出血量少,色紫黑,有小血块,少腹胀痛。治疗应首选

124.经间期出血量少,色红质黏腻,头晕腰酸,五心烦热。治疗应首选

(125~126 题共用备选答案)

A.完带汤

B.易黄汤

C.内补丸

D.止带方

E.知柏地黄丸

125.证见带下量多,色黄黏稠,有臭气。

应选

126.证见带下量多,色白质稀,淋漓不断,小便频数。应选

(127~128 题共用备选答案)

A.血瘀产后发热

B.感染邪毒产后发热

C.血虚产后发热

D.外感产后发热

E.产后蒸乳发热

127.产后高热寒战,小腹疼痛拒按,恶露量较多,色紫黯如败酱,有臭味,多属

128.产后寒热时作,恶露量少,色黯有块,小腹疼痛拒按,多属

(129~130 题共用备选答案)

A.加味道遥丸

B.养精种玉汤

C.开郁种玉汤

D.启宫丸

E.毓麟珠

129.婚久不孕,月经初潮较迟,月经后期,量少,色淡,腰膝酸软。应首选

130.婚久不孕,月经周期先后不定,经期腹痛,经量少,色黯有块,经前乳胀。应首选

(131~132 题共用备选答案)

A.毓麟珠

B.温胞饮

C.胎元饮

D.逍遥丸

E.开郁种郁汤

131.治疗不孕症肾气虚证,应首选的方剂是

132.治疗不孕症肝气郁结证,应首选的方剂是

(133~134 题共用备选答案)

A.金沸草散

B.清金化痰汤

C.六君子汤

D.沙参麦冬汤

E.二陈汤

133.小儿风寒咳嗽主要选方为

134. 小儿痰热咳嗽主要选方为
(135~136 题共用备选答案)
- A. 保和丸
B. 藿香正气丸
C. 葛根黄芩黄连汤
D. 参苓白术散
E. 附子理中汤合四神丸
135. 小儿伤食泻的首选方剂是
136. 小儿湿热泻的首选方剂是
(137~138 题共用备选答案)
- A. 泻心导赤汤
B. 六味地黄汤
C. 清瘟败毒饮
D. 银翘散
E. 沙参麦冬汤
137. 口疮之风热乘脾型首选方为
138. 口疮之心火上炎型首选方为
(139~140 题共用备选答案)
- A. 外感风热
B. 血热妄行
C. 阴虚火旺
D. 气滞血瘀
E. 气不摄血
139. 紫癜色淡, 反复发作, 病程较长, 面色少华, 神疲纳差, 舌质淡红, 应为
140. 紫癜色鲜红, 伴发热, 心烦口渴, 或腹痛, 衄血、便血, 舌红苔黄, 应为
(141~142 题共用备选答案)
- A. 自汗为主, 头部、肩背部明显
B. 自汗为主, 汗出遍身而不温
C. 盗汗为主, 手足心热
D. 自汗或盗汗, 头部、四肢为多
E. 汗出过多, 以额部、心胸为甚
141. 小儿汗证肺卫不固证的症状特点是
142. 小儿汗证营卫失调证的症状特点是
(143~144 题共用备选答案)
- A. 柴胡葛根汤
B. 黄连解毒汤
C. 五味消毒饮
D. 甘露消毒丹
E. 普济消毒饮
143. 治疗流行性腮腺炎邪犯少阳证, 应首选的方剂是
144. 治疗流行性腮腺炎热毒壅盛证, 应首选的方剂是
(145~146 题共用备选答案)
- A. 病原体侵入机体后发生了免疫反应但未引起明显的组织损伤
B. 病原体引起了明显的免疫反应和组织损伤
C. 病原体寄生在机体组织内, 不引起组织损伤, 但在机体免疫功能下降时可引起损伤, 出现症状和体征
D. 机体无明显症状但病原体可长期存在并可排出体外
E. 病原体被特异性免疫反应清除
145. 潜伏性感染的特点是
146. 隐性感染的特点是
(147~148 题共用备选答案)
- A. 单股正链 RNA 病毒
B. 单股负链 RNA 病毒
C. 双链 DNA 病毒
D. 双链 RNA
E. 无核酸的蛋白质颗粒
147. 流行性乙脑病毒是
148. 乙型肝炎病毒是
(149~150 题共用备选答案)
- A. 再燃
B. 复发
C. 混合感染
D. 再感染
E. 重复感染
149. 血培养为伤寒杆菌和副伤寒杆菌, 应为
150. 伤寒患者经治疗后体温由 40℃ 降为 37.9℃, 后又升至 40℃, 血培养阳性, 可认为

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	A	D	C	A	E	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	C	A	C	B	D	D	D	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	B	A	C	E	C	C	A	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	B	D	A	B	A	E	A	D	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	E	C	D	E	D	E	C	B	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	A	D	A	D	A	C	C	D	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	C	A	A	D	C	E	A	D	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	C	D	C	A	B	A	A	C	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	A	B	C	C	A	C	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	D	C	A	B	A	E	D	D	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	B	C	B	A	B	E	C	A	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	E	D	B	D	B	A	C	D	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	E	C	D	C	B	A	E	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	E	A	B	A	C	D	A	E	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	A	E	C	A	A	C	C	A